



**University of
Zurich**^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2017

Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2016 : Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik

Schaaf, Susanne

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-136373>

Published Research Report

Published Version

Originally published at:

Schaaf, Susanne (2017). Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS im Jahr 2016 : Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik. Zürich: ISGF.

Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-*info*-FOS en 2016

Rapport d'activités et statistiques annuelles globales

Ed.: Service de coordination act-*info*-FOS

Etabli par Susanne Schaaf

avec la collaboration d'Heidi Bolliger et Andreas Wenger

Le projet act-*info*-FOS est financé par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP)

No 379/2017

Table des matières

1	Résumé	5
2	Rapport d'activités 2016.....	10
2.1	Personnel du Service de coordination act-info-FOS.....	10
2.2	Centres participants	10
2.2.1	Liste des centres participant à act-info-FOS en 2016.....	10
2.3	Activités du Service de coordination act-info-FOS dans le cadre de la statistique de base	12
2.3.1	Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes act-info	14
2.3.2	Rapports et publications.....	14
2.4	Autres projets	14
2.4.1	Autres projets act-info-FOS	14
2.4.2	Autres projets globaux	15
2.5	Perspectives	15
3	Statistiques sur la clientèle act-info-FOS – Méthodologie.....	16
3.1	Instruments et collecte des données.....	16
3.2	Saisie électronique et contrôle des données.....	17
3.3	Préparation des données.....	17
3.4	Echantillons 2016	17
4	Annexe aux tableaux: tableaux des entrées et sorties 2016.....	19
4.1	Tableaux des entrées et des sorties 2016.....	20

Remerciements

Outil éprouvé de coopération entre les chercheurs et les praticiens, la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie se poursuit sous l'ère *act-info-FOS*. Nous souhaitons remercier ici tous ceux qui font partie de la Ligue *act-info-FOS* et qui ont contribué à la parution du présent rapport:

- les clients et les clientes pour leur disponibilité à répondre aux questions;
- les collaborateurs et les collaboratrices des établissements thérapeutiques participant au projet *act-info-FOS* pour leur investissement;
- l'équipe du groupe de coordination *act-info* : Etienne Maffli (SAMBAD, Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone), Marina Delgrande Jordan (*act-info-Residalc*) et Michelle Dey (HeGeBe), pour l'excellente collaboration;
- l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en tant que mandataire du projet, ainsi que les responsables à l'OFSP; plus particulièrement Verena Maag et Marc Raemy, responsables des projets *act-info* et des tâches y afférentes à l'OFSP, pour leur soutien actif et permanent au projet.
- Sylvie Gentizon, pour la traduction en français du présent rapport.

Service de coordination *act-info-FOS*

1 Résumé

En 2016, la documentation nationale *act-info-FOS* sur la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels s'est poursuivie pour la quatorzième année consécutive, après avoir existé durant huit ans en tant que Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie (FOS). Cette année, 39 établissements thérapeutiques, soit 85% des établissements suisses de traitement résidentiel des addictions (drogues illégales principalement), faisaient partie de la Ligue.

Le présent rapport annuel est composé du rapport d'activité du Service de coordination *act-info-FOS* et des statistiques annuelles 2016 sous forme de tableaux commentés. Durant l'année écoulée, 494 admissions et 465 sorties ont été consignées.

Les principaux résultats de 2016 en bref

Sexe	Les femmes constituent 24% de la clientèle.
Âge	L'âge moyen en début de traitement est de 33 ans.
Nationalité	74% de la clientèle est de nationalité suisse. La deuxième nationalité la plus représentée est la nationalité italienne, qui représente 5% des personnes interrogées.
Parcours thérapeutique	Au début du traitement, 90% de la clientèle a déjà suivi un ou plusieurs traitements: 84% pour des problèmes de drogues, 31% pour des problèmes d'alcool; 87% ont suivi une ou plusieurs cures de sevrage; 55% ont pris de la méthadone à titre substitutif, 58% ont suivi un traitement en résidentiel et 48% ont consulté en ambulatoire.
Substitution	39% des clients et clientes qui entament le traitement résidentiel suivent un traitement de substitution. Le taux est de 51% pour les femmes.
Motif incitant à entamer le traitement	50% des clients et clientes indiquent comme motif thérapeutique leur volonté d'abstinence et leur souhait de mener une vie exempte de drogues et d'addiction. 16% désirent une structuration de leur journée pour retrouver un mode de vie réglé, «normal» et meilleur. 17% sont motivés par l'intégration professionnelle, la formation ou l'apprentissage.
Logement	Durant les 6 mois précédant le début du traitement, 25% des clients et clientes habitent le plus souvent seuls, 16% logent chez leurs parents ou chez l'un ou l'autre de leurs parents, 15% avec leur partenaire et 16% en établissement résidentiel thérapeutique ou en foyer.
Relation de couple et enfants	Avant le début du traitement, 53% des clients et clientes ne sont pas dans une relation de couple. Les femmes ont plus souvent un partenaire que les hommes, et celles qui ont un partenaire vivent plus souvent que les hommes (39%) avec un partenaire ayant des problèmes de drogues (68%). 31 % des clients et clientes sont parents. Seuls 20% vivent avec leur(s) enfant(s).
Formation	Pour 43 % des clients et clientes, le niveau de formation le plus élevé atteint au moment de l'admission est un apprentissage.
Revenu et travail	Durant le semestre qui précède le traitement, 46% des clients et clientes ont pour revenu principal l'aide sociale, 13% une rente et 15% leur propre revenu. Avant leur admission, 31% ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (sans espoir de trouver un emploi), 13% sont incapables de travailler (AI/ indemnité journalière), 12% cherchent du travail et 24% ont un emploi.
Dettes	Au moment de leur admission, 18% des clients et clientes n'ont pas de dettes, 29% ont des dettes de 25 000 francs et plus.

Condamnation et mesure pénale ou administrative	59% de la clientèle a déjà fait l'objet d'une condamnation exécutoire, 45% a déjà été en prison et/ou en détention préventive, ces taux étant moins élevés pour les femmes que pour les hommes (29% contre 50%). Le plus souvent, la condamnation sanctionne une infraction à la loi sur les stupéfiants, un délit commis dans le but de se procurer des stupéfiants ou commis sous influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Pour 19% des clients et clientes, une mesure judiciaire est à l'origine du traitement.
Consommation: substance et âge	Le <i>problème principal</i> est la cocaïne (et ses dérivés) pour 31% de la clientèle, les opioïdes pour 23% (sans prescription), l'alcool pour 21% et le cannabis pour 14% respectivement. Les clients et clientes pour qui le cannabis pose problème sont le groupe le plus jeune: ils sont âgés de 24 ans en moyenne au moment de leur admission. Les clients et clientes pour qui l'alcool est un problème ont 37 ans en moyenne au début du traitement; cet âge est de 36 ans pour les personnes ayant pour problème principal les opioïdes et 33 ans pour ceux à qui la cocaïne pose problème. L'âge moyen au début de la consommation régulière est de 21 ans pour les personnes pour qui l'alcool est un problème, de 22 ans pour ceux ayant les opioïdes comme problème principal, de 22 ans aussi pour les personnes pour qui la cocaïne est un problème et de 16 ans pour ceux à qui le cannabis pose problème. Parmi les personnes dont le problème principal est l'alcool, 59% ont consommé la substance qui leur pose le plus problème chaque jour et 9% de 4 à 6 jours par semaine au cours des 6 derniers mois. Pour celles confrontées avant tout au problème des opioïdes, 46% ont consommé chaque jour et 18% de 4 à 6 jours par semaine. Pour celles faisant face surtout à la cocaïne et à ses dérivés, 29% ont consommé chaque jour et 21% de 4 à 6 jours par semaine. Pour celles pour qui le cannabis pose le problème principal, 73% ont consommé chaque jour et 16% de 4 à 6 jours par semaine.
Consommation: autres substances problématiques	D'autres substances que la substance la plus problématique sont épineuses pour la clientèle: les personnes confrontées avant tout au problème de l'alcool mentionnent la cocaïne, le cannabis, l'héroïne et les benzodiazépines comme autres substances posant problème. Les clients et clientes qui ont les <i>opioïdes</i> pour problème principal signalent la cocaïne, l'alcool, le cannabis et les benzodiazépines comme autres substances problématiques. Pour les personnes pour qui la <i>cocaïne</i> constitue le problème principal, l'alcool, l'héroïne, le cannabis et les benzodiazépines sont autant de problèmes supplémentaires. Les clients et clientes pour qui le <i>cannabis</i> est le problème majeur citent comme autres substances problématiques l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, MDMA/substances similaires et LSD. Tous les groupes considèrent le tabac comme étant une substance problématique.
Polytoxico-manie	44% des clients et clientes présentent des troubles liés à l'utilisation de drogues multiples selon le CIM-10. Une association de drogues souvent citée est l'association des opioïdes et de la cocaïne (12%).
Objectif en ce qui concerne la consommation	80% des clients et clientes visent l'abstinence définitive. Pour 93% des personnes pour qui le problème principal sont les opioïdes, l'objectif en ce qui concerne la consommation est l'abstinence définitive. Il en va de même pour 90% des personnes avec la cocaïne pour problème principal et pour 69% de celles pour qui l'alcool pose le principal problème.
Consommation: Comportements liés à l'injection	Parmi les 41% de clients et clientes qui ont déjà consommé des drogues par injection, 69% l'ont fait au cours des douze mois précédant le début de la thérapie, et 47% dans les 30 jours qui précèdent l'admission. Parmi les personnes qui ont déjà consommé par injection, 38% signalent avoir partagé des seringues ou des aiguilles avec d'autres (prévalence tout au long de la vie). Parmi les 17% qui ont partagé le matériel d'injection au cours des 12 derniers mois, 20% l'ont fait dans les 30 derniers jours. L'âge moyen de la première injection est de 22 ans.
Santé	87 % des clients se sont déjà soumis à un test de dépistage du VIH, dont 70% dans les 12 derniers mois, avec un résultat positif dans 3 % des cas. 82% ont passé un test de dépista-

	ge de l'hépatite C, dont 70% dans les 12 derniers mois. Le résultat était positif dans 22% des cas (dont 6% dans les 12 derniers mois).
Mode de sortie et traitement à la sortie	36% de la clientèle a achevé le traitement selon les termes convenus <i>sans</i> transfert, 19% l'a achevé comme prévu pour passer dans un établissement de traitement des addictions. Au total, 55% a terminé la thérapie comme convenu. Pour 33% des personnes, le traitement a été interrompu soit par le client soit par l'institution traitante. Parmi les personnes qui passent à un autre suivi, 43% ont rejoint un appartement protégé, 21% suivent un traitement en milieu résidentiel et 23% vont dans une structure de jour ou clinique de jour. Les personnes qui ont achevé le traitement selon les termes convenus (qu'elles passent ou non à un autre suivi) ont suivi un traitement de 509 jours en moyenne, une durée plus longue que pour les personnes dont le traitement a été interrompu (227 jours); 37 % des clients et clientes ont suivi un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel et pour 33%, un traitement de substitution était prévu après la sortie. Pour 54 % des clients et clientes, un suivi post-cure était prévu, le plus souvent sous forme de consultations dans des centres de conseil pour les problèmes liés aux drogues et des services de postcure.
Logement à la sortie	À leur sortie, 27% des clients vivent seuls, 18% logent dans leur famille d'origine (chez leurs parents ou chez l'un ou l'autre de leurs parents); 20% vivent dans un centre de traitement ou un foyer. 55% sont logés de manière stable.
Relation de couple	64% des clients et clientes ne sont pas en relation de couple à la sortie. La proportion des femmes (45%) est significativement plus basse que celle des hommes (70%).
Source de revenu à la sortie	À leur sortie, 55% des personnes ont pour source de revenu principale l'aide sociale, 17% une rente et 15% leur propre revenu. Une différence très significative apparaît en corrélation avec le mode de sortie: à leur sortie, 23% des personnes ayant achevé leur traitement vivent principalement de leur propre activité lucrative, contre 6% de celles dont le traitement a été interrompu.
Travail à la sortie	À leur sortie, 38% des clients et clientes ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (y compris les catégories sans perspective d'en trouver un, rente, incapacité de travail, sans «sans travail mais en recherche d'un emploi»); 19% ont un emploi, 22% sont en recherche d'emploi et 9% en formation. La clientèle dont le traitement s'est terminé comme prévu est active sur le marché de l'emploi de façon significativement plus fréquente que celle dont la thérapie a été interrompue (taux respectifs de 24% et 8%).
Dettes	À leur sortie, 23% seulement de la clientèle n'est pas endettée. 20% des clients et clientes ont des dettes allant de 25'001 à 100'000 francs ou plus.
Mesures, procédures en cours et décisions à la sortie	Une mesure pénale ou administrative, telle que poursuite d'une mesure, assistance de probation et exécution d'une peine suspendue, attend 24% des clients et clientes à leur sortie. Une procédure attend 16% de la clientèle, le plus souvent en raison d'infractions à la loi sur les stupéfiants ou de vols. Pour 25%, une décision administrative ou judiciaire devient exécutoire.
Consommation avant la sortie	11% des clients et clientes dont le problème principal sont les opioïdes et 5% des clients dont la cocaïne et ses dérivés pose le problème principal ont consommé quotidiennement ou à 4-6 jours par semaine (dans les 30 jours qui précèdent la sortie). De façon prévisible, les personnes dont le traitement se termine comme convenu ont consommé significativement moins souvent leur principale substance posant problème que celles dont le traitement s'est interrompu.
Pronostic à la sortie	Pour 44% des clients et clientes, un pronostic bon à très bon est établi au moment de leur sortie en ce qui concerne leur problème d'addiction.

Le chapitre thématique des rapports annuels *act-info*-FOS est supprimé en raison des importantes mesures d'économie que l'OFSP a prises s'agissant du système de monitoring *act-info*.

Activités en 2016

En 2016, le Service de coordination *act-info*-FOS a de nouveau travaillé dans le cadre de l'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes *act-info*. Cette équipe vise à améliorer la diffusion du monitoring et des produits *act-info* ainsi qu'à améliorer le potentiel d'utilisation d'*act-info*. *act-info* porte sur *les traitements*. Avec d'autres statistiques qui portent sur l'addiction, elle fournit des informations de base permettant d'apprécier l'addiction et son évolution en Suisse.

En 2016, les données *act-info* et les questionnaires ont été largement utilisés. Le service de coordination *act-info*-FOS...

- ...a apporté son appui aux institutions FOS pour rassembler les documents et données utiles à la thématique.
- ...a répondu aux questions posées par les institutions FOS sur l'interprétation des données et des statistiques et sur leur approche.
- ...a réalisé pour des institutions FOS des évaluations spécifiques.
- ...a conseillé des institutions FOS pour la planification de projets de recherche.
- ...a participé à des contributions d'institutions FOS destinées à la publication.
- ...a proposé des spécialistes de l'addiction pour des formations internes organisées par divers établissements résidentiels offrant des traitements de l'addiction.
- ...a apporté son appui à des étudiants en leur fournissant des chiffres concernant les traitements des addictions dans un cadre résidentiel en Suisse.

Perspectives: Le Service de coordination *act-info*-FOS poursuivra son action dans le cadre du projet global *act-info* ainsi que sa participation au développement du système de monitoring national *act-info*. Ces travaux ciblent l'amélioration du taux de couverture d'*act-info*, une meilleure utilisation d'*act-info* et de ses produits par l'OFSP et par tout canton intéressé, étant précisé qu'ils se déroulent dans un contexte de coupes budgétaires.

Le Service de coordination *act-info*-FOS prévoit de réaliser en Suisse alémanique un projet («SMS-gestützte Nachsorge und Monitoring nach stationärer Suchttherapie») de prévention des rechutes s'adressant à la clientèle après sa sortie d'un établissement de traitement. Ce projet de suivi post-cure s'appuie sur le SMS.

La publication d'«Éclairages», l'infolettre d'act-*info*, doit être suspendue pour cause de coupes budgétaires. Les publications de cette série figurant à l'adresse suivante:
<https://tinyurl.com/m9965gc>.

2 Rapport d'activités 2016

2.1 Personnel du Service de coordination act-info-FOS

Au cours de l'année 2016, les personnes suivantes ont pris part aux projets act-info-FOS ou du Service de coordination act-info-FOS à l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF) :

- Susanne Schaaf, lic. psychologie: responsable du projet Documentation de base act-info-FOS, directrice de recherche dans le domaine des traitements résidentiels de la toxicomanie
- Heidi Bolliger: collaboratrice de projet, secrétariat du Service de coordination act-info-FOS
- Andreas Wenger, MSc psychologie: appui informatique et statistique

2.2 Centres participants

En 2016, 39 établissements font partie d'act-info-FOS: 30 sont en Suisse alémanique (dont un situé au Tessin), 7 sont en Suisse romande (dont un établissement germanophone dans le canton du Jura) et 2 sont des centres italophones dans le canton du Tessin. 37 établissements ont remis des questionnaires de leur clientèle pour évaluation. Un établissement a été fermé en 2016 et un établissement a quitté la Ligue après avoir changé de groupe cible.


2.2.1 Liste des centres participant à act-info-FOS en 2016

AG	Institut für Sozialtherapie, Sozialtherapeutische Klinik, 5704 Egliswil
	Inst. für Sozialtherapie, Stiftung, RehabilitationsZentrum Niederlenz, 5702 Niederlenz
	Klinik im Hasel, 5728 Gontenschwil
AR	Best Hope, 9104 Waldstatt/Herisau
	RehabilitationsZentrum Lutzenberg, 9426 Lutzenberg
BE	Chly Linde, Therapeutische Gemeinschaft, 3089 Vorderfultigen
	Projekt Alp, Familienplatzierung, 3110 Münsingen
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Bordei, 6657 Palagnedra (TI) (jusqu'en juin 2016)
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Brienzwiler, 3856 Brienzwiler
	Stiftung Terra Vecchia, Familienplätze, 3011 Berne
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Melchenbühl, 3073 Gümligen
	Stiftung Terra Vecchia, Gemeinschaft Saurenhorn, 3054 Schüpfen
	suchttherapiebärn, 3006 Berne (Grofa et Muschle)
BL	Rütihus Krisenstation Wohnheim, 4402 Frenkendorf

FR	Foyer Horizon, Fondation Le Tremplin, 1783 Pensier
	Le Radeau, Centre d'Accueil communautaire, 1693 Orsonnens
JU	Clos-Henri, Centre de traitement pour personnes dépendantes, 2714 Le Prédame
LU	Akzent Prävention und Suchttherapie, Therapiezentrum Ausserhofmatt , 6105 Schachen
	Akzent Prävention und Suchttherapie, Therapiezentrum Lehn, 6012 Obernau/Kriens
	Novizonte (anciennement Neuhof), Therapeutische Gemeinschaft, 6020 Emmenbrücke
SO	casa fidelio, 4626 Niederbuchsiten
	Chratten, Therapeutische Gemeinschaft, 4229 Oberbeinwil
	Lilith, Zentrum für Frauen und Kinder, 4625 Oberbuchsiten
TI	Centro Residenziale a medio termine, 6516 Gerra Piano
	Villa Argentina, Centro terapeutico, 6900 Lugano
VD	Fondation Bartimée, 1422 Grandson
	Fondation Le Levant (Couvét, Pichollette), 1005 Lausanne
	Foyer du Relais, Association du Relais, 1110 Morges
VS	Foyer Rives du Rhône (via LVT), 1951 Sion
	CAAD, 1907 Saxon (retrait de FOS, changement du groupe cible)
ZG	Sennhütte, Fachinstitution für Suchttherapie, 6300 Zoug
ZH	Arche Therapie Bülach, 8180 Bülach
	Suchtbehandlung Frankental, Stationäre Therapie, 8049 Zurich
	Freihof Küsnacht, sozialtherapeutische Einrichtung, 8700 Küsnacht
	Meilestei, 8124 Uessikon bei Maur
	Neuthal, Therapeutische Gemeinschaft, 8344 Bäretswil
	Quellenhof, 8546 Gundetswil
	Rehazentrum Sunedörfli, 8816 Hirzel
	start again, Zentrum für Suchttherapie, 8032 Zurich
	Ulmenhof, Sozialtherapie, 8913 Ottenbach

Au cours de la période sous revue, le Service de coordination act-*info*-FOS a reçu des «Données relatives à l'institution» actualisées (questionnaire sur les institutions, version 3.2) concernant 35 des 39 centres de traitement: 46% (18) sont des centres de traitement résidentiel traitant exclusivement des problèmes liés aux substances *illégales*, 23% (9) accueillent des clients et clientes dont les problèmes sont liés à tout type de substance, 21% (8) traitent des problèmes de *dépendance* divers (liés ou non à des substances) et 10% (4) traitent des problèmes de dépendance tout en assurant d'autres fonctions.

Dans 28% des institutions (11), il est possible de suivre un traitement de sevrage complet ou partiel. Parmi les établissements, 39% comportent jusqu'à 12 places (15), 28% entre 13 et 20 places (11) et 33% plus de 20 places (13) (illustration 1).

Illustration 1: Ventilation en fonction du nombre de places de l'institution

2.3 Activités du Service de coordination act-info-FOS dans le cadre de la statistique de base

En 2016, les activités principales du Service de coordination act-info-FOS auront été la participation aux travaux de l'équipe du projet de système de monitoring national act-info (2.3.1) ainsi que des rapports et publications (cf. chap. 2.3.2). Étant donné que quelques institutions continuent à collecter leurs données sur papier, les travaux de routine tels que l'enregistrement et le codage des questionnaires remplis ainsi que l'organisation de la saisie des données sont restés des tâches centrales. Enfin, dans le cadre des statistiques de base, il a également fallu assurer l'apurement des données, la coordination de toutes les activités au sein d'act-info-FOS et la communication des renseignements concernant le recueil des données et les rapports.

L'amélioration du taux de couverture de la statistique act-info-FOS constitue une tâche permanente. Fin 2016, 46 établissements au total offrent un traitement de la toxicomanie en milieu résidentiel. Ce nombre sert de référence au calcul du taux de couverture. Fin 2016 toujours, 39 des 46 établissements participent à la Ligue, soit 85%. Ce résultat peut être qualifié de très bon puisque la participation à la statistique est facultative.

L'OFSP s'intéresse aux entrées et sorties de 2016 des établissements dont l'offre correspond de fait à la Ligue act-info-FOS, mais qui ne participent toutefois pas à la Ligue. Dans la mesure où ils sont disponibles, les renseignements figurent dans le tableau 1.

Tableau 1: Entrées et sorties 2016 des établissements qui ne font pas partie de la Ligue FOS

Établissements	Entrées 2016	Sorties 2016
SG Entwöhnung A5	153	167
ESTA (Bereich Therapie Villa)	45	43
Gilgamesch	17	16
CRMT Thônex et Toulourenc	44	43
Les Vacheries UTD	108	126
Pontareuse, Fondation Goéland	25	28
Total	392	423

Tableau 2: Taux de couverture act-info-FOS

Établissements (chiffres de fin 2016)	Nombre d'établissements
Groupe des établissements déjà membres d'act-info-FOS	
Établissements act-info-FOS qui fournissent régulièrement des données	37
Établissements act-info-FOS qui ne fournissent pas régulièrement de données	2
Groupe des établissements dont le profil correspond à act-info-FOS mais qui déclinent toute participation	
Établissements non intéressés	7
Total des établissements résidentiels de traitement des addictions	46
Nombre d'établissements participants (sans les institutions intéressées et membres potentiels)	39

Une enquête concernant l'occupation des établissements a été menée le 30 septembre 2014 dans les secteurs act-info. Le jour de l'enquête, 54 établissements de traitement des dépendances dans un cadre résidentiel (drogues illégales; sans la clinique Im Hasel, qui fait partie du secteur Residalc) accueillaient 715 personnes en thérapie (les personnes avec des problèmes de drogues de la clinique Im Hasel étant incluses). Au jour de référence, 44'000 clients et clientes environ étaient suivis pour traitement ou consultation dans les cinq secteurs de traitement act-info: HeGeBe, act-info-FOS, act-info-Residalc SAMBAD et la Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone.

2.3.1 Participation dans l'équipe du monitoring national d'aide aux personnes dépendantes *act-info*

L'équipe du projet de statistiques nationales d'aide aux personnes dépendantes *act-info*¹, à laquelle appartient la direction du projet *act-info-FOS*, a terminé l'évaluation complète des données *act-info* 2015 au cours de l'année de référence. Le rapport *act-info* 2015 peut être commandé gratuitement en version reliée, ou téléchargé sous <https://tinyurl.com/lzv6dvn>.

2.3.2 Rapports et publications

Schaaf, S. (2016). Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie *act-info-FOS* im Jahr 2015. Tätigkeitsbericht und Jahresstatistik. Bericht Nr. 367. Zürich: ISGF.

Schaaf, S. (2016). Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie *act-info-FOS* en 2015. Rapport d'activités et statistiques annuelles globales. Rapport no. 369. Zurich: ISGF.

Schaaf, S. (2016). Gesamtbericht 12. Stichwochenerhebung zur Klientenzufriedenheit in stationärer Suchttherapie QuaTheSI-40. 7. bis 11. März 2016. Bericht Nr. 371. Zürich: ISGF.

Schaaf, S. (2016). Rapport général. 12ème enquête de satisfaction des clientes et des clients d'institutions du domaine des dépendances QuaTheSI-40. 7 - 11 mars 2016. Rapport No 373. Zurich: ISGF.

Dey, M. & Schaaf S. (2016). Zufriedenheit der Klienten und Klientinnen in ambulanter und stationärer Suchthilfe (QuaTheSI). Gesamtbericht der Erhebung 2016. Bericht Nr. 374. Zürich: ISGF.

2.4 Autres projets

En 2016, le Service de coordination *act-info-FOS* s'est engagé dans d'autres projets, parfois coordonnés avec *act-info-FOS* et parfois distincts, mais qui étaient exclusivement ou essentiellement liés au domaine de l'aide en matière de dépendance dispensée dans le secteur résidentiel.

2.4.1 Autres projets *act-info-FOS*

Documentation de la clientèle des centres de désintoxication dans le canton d'Argovie: La description de la clientèle des centres de sevrage du canton d'Argovie, effectuée dans le cadre du controlling cantonal, a également été réalisée en 2016. Comme les années précédentes, les

¹ *act-info* comprend les domaines partiels suivants: traitements résidentiels des dépendances à l'alcool et aux médicaments (*act-info-Residalc*: Marina Delgrande Jordan); traitements résidentiels des dépendances aux drogues illégales (*act-info-FOS*: Susanne Schaaf); aide psycho-sociale ambulatoire en cas de problèmes de dépendance (SAMBAD: Etienne Maffli); statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone (Etienne Maffli ad interim); traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe: Michelle Dey). Pour plus d'informations sur le projet global *act-info*:

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/suchtberatung-therapie/suchthilfestatistiken-act-info.html ou www.isgf.ch (>*act-info-FOS*).

données ont été saisies en ligne au moyen d'un questionnaire court et compatible avec *act-info*. L'évaluation des données a été remise tous les trimestres au mandant.

Petits projets et mandats de conseil donnés par des institutions ou des cantons: en 2016, certaines institutions et autorités nous ont mandatés pour un conseil ou une position ou dans le cadre d'un petit projet, le plus souvent pour évaluer de manière ciblée des données existantes (pour des évaluations pluriannuelles, des thèmes particuliers). Des évaluations ne sont remises à des autorités qu'avec l'accord des institutions concernées pour l'exploitation des données.

2.4.2 Autres projets globaux

Enquête relative à la satisfaction de la clientèle en traitement résidentiel de la toxicomanie QuaTheSI-I-40: la 12^e enquête QuaTheSI-I-40 relative à la satisfaction de la clientèle des centres de traitement résidentiels de la toxicomanie s'est déroulée du 7 au 11 mars 2016. Elle a eu lieu dans 50 institutions et l'évaluation se base sur 843 questionnaires valablement remplis. Les établissements ont reçu un rapport confidentiel d'institution contenant les données de leur clientèle, des résultats qui peuvent être comparés avec ceux du groupe de référence (regroupement des institutions selon les traitements offerts: drogues ou alcool respectivement). Les valeurs de satisfaction sont, de manière générale, élevées. Le rapport global de la 12^e enquête relative à la satisfaction de la clientèle en traitement résidentiel de la toxicomanie QuaTheSI-I-40 (2016) est disponible pour téléchargement à l'adresse: <http://tinyurl.com/o9vrzo>.

En plus le rapport intitulé «Zufriedenheit der Klienten und Klientinnen in ambulanter und stationärer Suchthilfe (QuaTheSI)», Dey M. & Schaaf S., 2016 (en allemand): www.zora.uzh.ch/130657

2.5 Perspectives

Dans le cadre du projet global *act-info*, le Service de coordination *act-info*-FOS continuera d'être intégré à l'équipe de projet et de participer au développement du système de monitoring national. Le contexte est celui d'une coupe budgétaire d'un quart dans le financement des statistiques partielles. L'OFSP conçoit actuellement avec un institut externe un nouveau projet de développement du système de monitoring *act-info*, qui prévoit notamment de prendre en compte les indicateurs directeurs («Leitindikatoren») et les indicateurs centraux «Kernindikatoren») du système de monitoring des addictions.

Au niveau d'*act-info*-FOS, la poursuite de la statistique partielle sur les thérapies résidentielles est garantie.

De plus, des analyses spécifiques sont effectuées à la demande d'institutions de thérapie (p.ex. comparaison pluriannuelle du profil de la clientèle d'une institution) et des réflexions sont engagées sur une utilisation plus large des données d'*act-info*-FOS.

Le Centre de coordination act-info-FOS élabore un programme de suivi post-cure qui utilise les SMS. D'une durée de six mois, ce projet prévu en Suisse alémanique vise à étudier deux types d'interventions différentes utilisées pour la prévention des rechutes auprès de la clientèle qui sort d'un établissement résidentiel de traitement des addictions ou de l'alcoolisme (en Suisse alémanique). A ce jour, les programmes de suivi post-cure utilisant les SMS qui ont été réalisés dans d'autres domaines thérapeutiques ont prouvé leur efficacité. Les établissements ont été informés et invités à y participer.

3 Statistiques sur la clientèle act-info-FOS – Méthodologie

La Ligue act-info-FOS produit une documentation nationale, en continu, de la clientèle des établissements thérapeutiques résidentiels et de l'évaluation du séjour qui y est fait. Pour ce faire, des informations sont recueillies au moment de l'admission de la clientèle et au moment de leur sortie, sur des sujets tels que leur situation sociale (logement, travail, etc.), leur consommation de drogues, leur santé ou encore leur situation juridique.

Ces relevés nationaux sur la clientèle des établissements de traitement résidentiel des toxicomanies en Suisse sont effectués depuis 1995 sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et dépouillés annuellement. Depuis le 1^{er} janvier 2003, act-info-FOS emploie les questionnaires act-info.

3.1 Instruments et collecte des données

Depuis janvier 2013, les données sont recueillies au moyen de la version révisée 4.1. La collecte des questionnaires se fait dans les centres participant à l'enquête act-info-FOS. Le client est interrogé par un collaborateur du centre de traitement, si possible dans les deux semaines qui suivent son admission. Le questionnaire de sortie est rempli dès lors qu'un client ou une cliente cesse la thérapie, selon les termes convenus ou non, qu'il passe à un autre traitement ou qu'il s'installe en appartement protégé. Le questionnaire de sortie est également rempli par un membre de l'équipe, mais pas forcément dans le cadre d'une enquête auprès de la clientèle. En effet, en raison des sorties non prévues (interruptions), cela s'avère souvent impossible. Les personnes participant à la recherche disposent d'un manuel et de l'appui téléphonique du Service de coordination act-info-FOS.

Règles concernant la protection des données

Dans le cadre du projet global act-info, la protection des données est garantie par un procédé de chiffrement multiple élaboré selon les standards de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans un premier temps, les différents établissements thérapeutiques attribuent un code personnel à chaque client selon des règles uniformes. Ce code, qui se compose de quatre lettres, accompagne les données qui sont transmises à l'Institut suisse de recherche sur la santé publique

et les addictions (ISGF). Un deuxième chiffrement intervient au *niveau de l'ISGF*, avant que les données de base ne soient intégrées sous forme totalement anonymisée dans la base de données nationale de l'OFSP. Chaque série de données est automatiquement chiffrée à l'aide du code personnel ainsi que d'autres données par un système à double clé (clé personnelle de 16 caractères et clé de session de 256 caractères). Un troisième chiffrement, réalisé au moyen d'une clé annuelle, est effectué à l'OFSP dans la base de données nationale.

L'utilisation de la base de données de l'ISGF, qui rassemble les variables du noyau et des modules, est réservée au Service de coordination act-info-FOS. Les objectifs convenus doivent être respectés et la protection des données est garantie, conformément à la législation. Toute tierce personne (canton, autres instituts de recherche) qui souhaite obtenir un accès à cette banque de données doit effectuer une demande préalable en ce sens et obtenir l'accord des institutions concernées.

3.2 Saisie électronique et contrôle des données

En 2016, 27 institutions ont saisi leurs données en ligne, totalisant ainsi une majorité de questionnaires (73%). Les questionnaires adressés au Service de coordination act-info-FOS sous forme papier ont été saisis informatiquement à l'aide du logiciel DataPool par le service de coordination act-info-FOS. La saisie des données avec le logiciel DataPool, qui constitue en même temps une banque de données centrale d'administration et d'enregistrement des épisodes de traitement, s'accompagne de premiers contrôles (p.ex. pas de réponses multiples aux questions simples, vérification des données de base d'un épisode de traitement à l'ouverture du questionnaire). Le logiciel DataPool procède à d'autres vérifications de routine qui permettent de s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des réponses données aux questions-clés.

3.3 Préparation des données

Grâce aux procédures de contrôle intégrées dans DataPool, les données sont de grande qualité avant même leur transfert dans le programme SPSS. Là où cela était nécessaire, des vérifications de plausibilité supplémentaires ont été effectuées et les réponses manquantes ou non valables définies (*missing data*). Enfin, les recodages nécessaires au chapitre consacré aux tableaux ont été entrepris.

3.4 Echantillons 2016

Les données ont été collectées régulièrement auprès de tous les clients et clientes entrés et sortis des centres act-info-FOS. L'évaluation 2016 se base sur 494 questionnaires d'entrée et 465 questionnaires de sortie. Près de trois quarts des questionnaires proviennent de Suisse alémanique, un quart de Suisse romande, et les autres d'établissements italophones du canton du Tessin (tableau 3).

Tableau 3: Base de données pour le rapport annuel 2016

Région linguistique	ENTREES 2016		SORTIES 2016	
	N	%	N	%
Suisse alémanique *	352	71%	322	69%
Suisse romande	124	25%	116	25%
Suisse italienne *	18	4%	27	6%
TOTAL Suisse	494	100%	465	100%

*Les centres de langue allemande se trouvant au Tessin sont comptabilisés ici avec la Suisse alémanique.

4 Annexe aux tableaux: tableaux des entrées et sorties 2016

Le chapitre des tableaux comprend les chiffres correspondant à la plupart des questions des questionnaires d'entrée et de sortie se rapportant aux données 2016, ventilés par sexe. Les numéros indiqués entre parenthèses dans les titres des tableaux renvoient aux questions des questionnaires d'entrée et de sortie (version E/A4.1).

Les réponses aux différentes questions sont indiquées dans les tableaux en chiffres absolus et en chiffres relatifs. Des données sur les valeurs statistiques existent en partie: Cramer's V et niveaux de signification correspondants: $p < 0.05$ (*), $p < 0.01$ (**), $p < 0.001$ (***)).

Ci-dessous, quelques notions aidant la lecture:

- Total: le nombre de cas. Ce nombre n'est pas toujours identique au total des entrées ou des sorties, puisque par exemple, certaines questions ne sont pertinentes que pour une partie des personnes interviewées.
- Missing: par rapport au total des personnes pour lesquelles il existe des données, le missing donne le nombre de cas (personnes) pour lesquels il n'existe pas de réponse valable ou pas de réponse du tout.
- Nombre de personnes: dans une question avec réponses multiples, il est indiqué le nombre de personnes qui ont donné des réponses (possibilité de plusieurs réponses par personne).
- Réponses: dans une question avec réponses multiples, on est intéressé de savoir comment les différentes rubriques d'une question ont été nommées.
- Réponses %: dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au total de toutes les réponses.
- Personnes %: dans une question avec réponses multiples, on indique les parts de pourcentage par rubrique par rapport au nombre de personnes qui ont donné des réponses. Ces parts de pourcentage sont généralement plus élevées que pour les réponses %, car les réponses % comprennent des réponses multiples.
- Moyenne (valeur moyenne): moyenne arithmétique (moyenne) des valeurs visant une certaine rubrique (par ex. durée de séjour moyenne).
- Standard deviation (déviations standard): mesure pour la dispersion des valeurs autour de la moyenne: plus petit est l'écart standard, plus grande est l'homogénéité des réponses par rapport à la moyenne. Par conséquent, l'échantillon de réponse est d'autant plus hétérogène que l'écart standard est plus grand.
- Médiane: valeur des réponses à une certaine catégorie qui se trouve au milieu (50% des personnes interviewées ont des valeurs plus élevées, 50% plus basses).
- Percentiles (quartile): le percentile 25 désigne la valeur par rapport à laquelle 25% des personnes ont une valeur plus basse et 75% des personnes une valeur plus élevée; le percentile 75 désigne la valeur par rapport à laquelle 25% des personnes ont une valeur plus élevée et 75 % des personnes plus basse.

4.1 Tableaux des entrées et des sorties 2016

Tableaux des entrées 2016

0 Données relatives aux clients et clientes	1
A Cadre de la prise en charge.....	7
B Données sociodémographiques.....	13
C Consommations et dépendance.....	24
D Santé.....	55

Tableaux des sorties 2016

0 Données relatives aux clients et clientes	1
A Cadre de la prise en charge.....	3
B Données sociodémographiques.....	10
C Consommations et dépendances.....	19
D Pronostic	31

TABLEAUX act-info-FOS ENTRÉES 2016

0 DONNÉES RELATIVES AUX CLIENT-E-S

L'évaluation des entrées enregistrées en 2016 se base sur **494 questionnaires valablement** remplis. Ces 494 entrées correspondent à 483 personnes : au cours de l'année de référence 2016, 472 clientes et clients ont été admis une fois dans un établissement act-info-FOS, 11 personnes deux fois. Les tableaux suivants se réfèrent au nombre des entrées.

0.1 Source des informations (vmed100)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
informations fournies par le client/la cliente	305	82,9%	95	79,8%	400	82,1%
informations fournies par l'intervenant-e	63	17,1%	24	20,2%	87	17,9%
Total	368	100,0%	119	100,0%	487	100,0%
Missing	6		1		7	

0.2 Les femmes représentent 24% des personnes interrogées .

0.2 Sexe (vmec010)

	TOTAL act-info-FOS	
	n	%
hommes	374	75,7%
femmes	120	24,3%
Total	494	100,0%
Missing	0	

0.3 Le taux de femmes dans les institutions va de 17 à 26 % selon les régions linguistiques.

0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (standards OFS) (vmec020)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu` à 14 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-19 ans	27	7,2%	10	8,3%	37	7,5%
20-24 ans	41	11,0%	16	13,3%	57	11,6%
25-29 ans	76	20,4%	21	17,5%	97	19,7%
30-34 ans	64	17,2%	26	21,7%	90	18,3%
35-39 ans	62	16,6%	21	17,5%	83	16,8%
40-44 ans	52	13,9%	9	7,5%	61	12,4%
45-49 ans	30	8,0%	10	8,3%	40	8,1%
50-54 ans	14	3,8%	5	4,2%	19	3,9%
55-59 ans	4	1,1%	1	0,8%	5	1,0%
60-64 ans	3	0,8%	1	0,8%	4	0,8%
65-69 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
70-74 ans	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75 ans et plus	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	373	100,0%	120	100,0%	493	100,0%
Missing	1		0		1	

0.5 61 % des personnes en traitement résidentiel ont 30 ans et plus (tab. 0.5). Au début du traitement, la moyenne d'âge des hommes est de 33,5 ans. Les femmes ont 32,7 ans en moyenne (tab. **0.6**).

0.5 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu` à 19 ans	27	7,2%	10	8,3%	37	7,5%
20-24 ans	41	11,0%	16	13,3%	57	11,6%
25-29 ans	76	20,4%	21	17,5%	97	19,7%
30-39 ans	126	33,8%	47	39,2%	173	35,1%
40 ans et plus	103	27,6%	26	21,7%	129	26,2%
Total	373	100,0%	120	100,0%	493	100,0%
Missing	1		0		1	

0.6 Statistique: Âge, moyenne (vmec020)

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviat ion standard	Valid Cases
hommes	33,49	33,00	15,00	62,00	9,67	373
femmes	32,72	32,00	17,00	60,00	9,67	120
Total	33,30	32,00	15,00	62,00	9,67	493

0.7 État civil (vmec040)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
célibataire	300	82,4%	82	71,9%	382	79,9%
marié-e	16	4,4%	6	5,3%	22	4,6%
séparé-e (juridiquement)	9	2,5%	4	3,5%	13	2,7%
divorcé-e	35	9,6%	20	17,5%	55	11,5%
veuf/veuve	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
partenariat enregistré (PaCS)	4	1,1%	1	0,9%	5	1,0%
Total	364	100,0%	114	100,0%	478	100,0%
Missing	10		6		16	

domicile canton

.....

0.8a Nombre de client-e-s selon le domicile canton (vmec030c)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
AG	23	6,3%	8	6,8%	31	6,4%
AI	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
AR	2	0,5%	2	1,7%	4	0,8%
BE	47	12,9%	19	16,1%	66	13,7%
BL	20	5,5%	7	5,9%	27	5,6%
BS	22	6,0%	5	4,2%	27	5,6%
FR	12	3,3%	2	1,7%	14	2,9%
GE	10	2,7%	2	1,7%	12	2,5%
GL	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
GR	4	1,1%	3	2,5%	7	1,5%
JU	2	0,5%	1	0,8%	3	0,6%
LU	26	7,1%	11	9,3%	37	7,7%
NE	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
NW	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
OW	1	0,3%	1	0,8%	2	0,4%
SG	19	5,2%	4	3,4%	23	4,8%
SH	2	0,5%	0	0,0%	2	0,4%
SO	17	4,7%	4	3,4%	21	4,4%
SZ	4	1,1%	0	0,0%	4	0,8%
TG	7	1,9%	2	1,7%	9	1,9%
TI	13	3,6%	2	1,7%	15	3,1%
UR	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
VD	51	14,0%	19	16,1%	70	14,5%
VS	19	5,2%	4	3,4%	23	4,8%
ZG	4	1,1%	0	0,0%	4	0,8%
ZH	53	14,6%	22	18,6%	75	15,6%
Total	364	100,0%	118	100,0%	482	100,0%
Missing	10		2		12	

villes de moyenne importance: > 100 000 habitants,
 petites villes: < 100 000 habitants
 villes isolées > 10'000 habitants

0.8b Degré d'urbanité (vmec030a)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
grands centres urbains Zurich, Bâle, Genève	45	12,6%	10	8,5%	55	11,6%
periphérie des trois grands centres urbains	34	9,5%	22	18,8%	56	11,8%
villes de moyenne importance	84	23,5%	29	24,8%	113	23,8%
petites villes	115	32,1%	28	23,9%	143	30,1%
campagne	80	22,3%	28	23,9%	108	22,7%
Total	358	100,0%	117	100,0%	475	100,0%
Missing	16		3		19	

0.3 Nombre de client-e-s selon la région linguistique (institution)

	Suisse alémanique		Romandie		Tessin		GESAMT act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%	n	%
hommes	262	74,4%	97	78,2%	15	83,3%	374	75,7%
femmes	90	25,6%	27	21,8%	3	16,7%	120	24,3%
Total	352	100,0%	124	100,0%	18	100,0%	494	100,0%
Missing	0		0		0		0	

Nationalité

.....

0.9a 74% de la clientèle est de nationalité suisse. Le plus grand groupe d'étrangers est composé par les personnes de nationalité italienne (5%).

0.9a Nationalité alphabétique (vnec050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	261	72,3%	83	78,3%	344	73,7%
Afrique du Sud	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Albanie	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
Allemagne	7	1,9%	3	2,8%	10	2,1%
Angola	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Bosnie-Herzégovine	3	0,8%	1	0,9%	4	0,9%
Brésil	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
Cameroun	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Colombie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Côte d'Ivoire	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Croatie	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
Espagne	5	1,4%	3	2,8%	8	1,7%
France	6	1,7%	1	0,9%	7	1,5%
Hongrie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Iraq	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
Italie	20	5,5%	3	2,8%	23	4,9%
Kenya	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Kosovo	5	1,4%	1	0,9%	6	1,3%
Macédoine (anc. rép. youg.)	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Maroc	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Monténégro	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
Pays-Bas	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Pologne	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Portugal	14	3,9%	4	3,8%	18	3,9%
Rép. Dominicaine	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
Rép. Tchèque	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Russie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Serbie	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
Sierre Leone	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Slovaquie	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Somalie	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Thaïlande	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
Tibet (Chine)	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Turquie	12	3,3%	0	0,0%	12	2,6%
Ukraine	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Total	361	100,0%	106	100,0%	467	100,0%
Missing	13		14		27	

0.9b Nationalité, regroupée (vnec050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	261	72,3%	83	78,3%	344	73,7%
Europe de l'Ouest ou du Nord, UE	13	3,6%	5	4,7%	18	3,9%
Europe du Sud: Italie	20	5,5%	3	2,8%	23	4,9%
Europe du Sud: Espagne et Portugal	19	5,3%	7	6,6%	26	5,6%
Europe de l'Est ou du Sud-Est	36	10,0%	3	2,8%	39	8,4%
Nationalités restantes	12	3,3%	5	4,7%	17	3,6%
Total	361	100,0%	106	100,0%	467	100,0%
Missing	13		14		27	

0.9c Nationalité, regroupée sans Suisse (vnec050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Europe de l'Ouest ou du Nord, UE	13	13,0%	5	21,7%	18	14,6%
Europe du Sud: Italie	20	20,0%	3	13,0%	23	18,7%
Europe du Sud: Espagne et Portugal	19	19,0%	7	30,4%	26	21,1%
Europe de l'Est ou du Sud-Est	36	36,0%	3	13,0%	39	31,7%
Nationalités restantes	12	12,0%	5	21,7%	17	13,8%
Total	100	100,0%	23	100,0%	123	100,0%
Missing	274		97		371	

0.10 Nationalité, catégorisée (vnec050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
Suisse	261	72,3%	83	78,3%	344	73,7%
Union européenne	59	16,3%	15	14,2%	74	15,8%
Autre	41	11,4%	8	7,5%	49	10,5%
Total	361	100,0%	106	100,0%	467	100,0%
Missing	13		14		27	

A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

A1 La majorité des personnes en traitement résidentiel (90%) a déjà suivi un ou plusieurs traitements avant son admission de 2016.

A1 Traitements antérieurs (vneb050x-e)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	39	10,9%	7	6,1%	46	9,7%
oui	319	89,1%	108	93,9%	427	90,3%
Total	358	100,0%	115	100,0%	473	100,0%
Missing	16		5		21	

A2 84% des personnes ont déjà suivi un traitement pour des problèmes de drogues, 31% un traitement pour des problèmes d'alcool.

A2 Raison: sous-groupe: traitements antérieurs oui (plusieurs réponses: vneb050a-e)

		Sexe		TOTAL	
		hommes	femmes		
.	oui, pour problèmes liés à l`alcool	réponses	88	38	126
		personnes %	28,9%	38,4%	31,3%
	oui, pour problèmes liés aux drogues	réponses	263	77	340
		personnes %	86,5%	77,8%	84,4%
	oui, pour problèmes liés aux médicaments	réponses	27	16	43
		personnes %	8,9%	16,2%	10,7%
	oui, pour problèmes liés au tabac	réponses	10	0	10
		personnes %	3,3%	0,0%	2,5%
	oui, pour troubles comparables à une dépendance	réponses	23	15	38
		personnes %	7,6%	15,2%	9,4%
Total	réponses		411	146	557
	réponses %		100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes		304	99	403
	personnes %		135,2%	147,5%	138,2%
Missing		15	9	24	

A3 87% de la clientèle ayant déjà suivi un (ou plusieurs) traitement(s) ont déjà suivi une ou plusieurs cures de sevrage, 55% un programme de substitution, 58% un traitement résidentiel et 48 % ont suivi un traitement ambulatoire.

A3 Types de traitements antérieurs, sous-groupe: traitements antérieurs oui (plusieurs réponses: vneb060a-i)

		Sexe		TOTAL
		hommes	femmes	
traitement avec prescription d'héroïne	réponses	20	6	26
	personnes %	6,3%	5,7%	6,2%
substitution: méthadone, Subutex®, etc.	réponses	170	62	232
	personnes %	53,6%	59,0%	55,0%
autre traitement médicamenteux des dépendances	réponses	47	20	67
	personnes %	14,8%	19,0%	15,9%
prise en charge/thérapie ambulatoire	réponses	148	56	204
	personnes %	46,7%	53,3%	48,3%
prise en charge dans une structure de jour ou clinique de jour	réponses	36	17	53
	personnes %	11,4%	16,2%	12,6%
traitement résidentiel	réponses	183	63	246
	personnes %	57,7%	60,0%	58,3%
sevrage	réponses	282	87	369
	personnes %	89,0%	82,9%	87,4%
groupe d'entraide ou d'auto-support	réponses	30	10	40
	personnes %	9,5%	9,5%	9,5%
autre(s)	réponses	4	6	10
	personnes %	1,3%	5,7%	2,4%
Total	réponses	920	327	1247
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	317	105	422
	personnes %	290,2%	311,4%	295,5%
Missing		2	3	5

Cures de sevrage

.....

A4 33% des clients et clientes ont déjà entrepris plus de trois tentatives de sevrage avec suivi professionnel.

A4 Cure(s) de sevrage avec accompagnement professionnel (vzee010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune	56	16,6%	14	13,9%	70	15,9%
une fois	68	20,1%	25	24,8%	93	21,2%
deux fois	57	16,9%	11	10,9%	68	15,5%
trois fois	38	11,2%	8	7,9%	46	10,5%
quatre fois	31	9,2%	7	6,9%	38	8,7%
cinq fois	15	4,4%	7	6,9%	22	5,0%
six fois ou plus	65	19,2%	20	19,8%	85	19,4%
cure de sevrage, nombre exact inconnu	8	2,4%	9	8,9%	17	3,9%
Total	338	100,0%	101	100,0%	439	100,0%
Missing	92		33		125	

A5 62% de la clientèle est passée d'une cure de sevrage au traitement résidentiel actuel.

A5 Transfert d'une cure de sevrage (vzee050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	128	36,7%	42	41,6%	170	37,8%
oui, même institution	37	10,6%	11	10,9%	48	10,7%
oui, autre institution	184	52,7%	48	47,5%	232	51,6%
Total	349	100,0%	101	100,0%	450	100,0%
Missing	25		19		44	

Traitement de substitution

.....

A6 51% des clients et clientes ont déjà suivi un programme de substitution (y compris avec héroïne) (2015: 57%). L'âge moyen au début du traitement de substitution est de 26 ans. Les hommes ont commencé leur premier traitement de substitution en moyenne à l'âge de 27 ans, soit significativement plus tard que les femmes (à 24 ans en moyenne (tab. **A7**, $p < .05$).

A6 Déjà suivi un traitement de substitution (méthadone; prescription d'héroïne) (vneb065)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, jamais	173	50,0%	49	44,1%	222	48,6%
oui	173	50,0%	62	55,9%	235	51,4%
Total	346	100,0%	111	100,0%	457	100,0%
Missing	28		9		37	

A7 Statistique: Âge au début du premier traitement de substitution (vneb066)

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases
hommes	26,97	25,00	14,00	50,00	7,13	140
femmes	24,15	23,00	17,00	43,00	5,72	48
Total	26,25	25,00	14,00	50,00	6,89	188

A8 39% des clients et clientes suivent encore un programme de substitution en parallèle au moment où ils entament le traitement résidentiel. La proportion des femmes (51 %) est significativement plus importante que celle des hommes (36%) (Cr'sV=.13, $p < .01$).

A8 Actuellement dans un programme de substitution ou de prescription d'héroïne (vmeb070)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	218	64,3%	52	49,5%	270	60,8%
oui	121	35,7%	53	50,5%	174	39,2%
Total	339	100,0%	105	100,0%	444	100,0%
Missing	35		15		50	

A9 Le produit de substitution principal est la méthadone (58%; 2015: 77%). Autres opioïdes: p.ex. la buprénorphine (Temgesic®, Subutex®) (35%; 2015: 21%); autres substances: p.ex. la naltrexone (Naltrexin®, 5 %).

A9 Quel programme de substitution ou prescription d'héroïne (vneb075)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
héroïne	3	2,5%	0	0,0%	3	1,7%
méthadone	70	58,3%	31	58,5%	101	58,4%
autres opioïdes (p.ex. la buprénorphine)	43	35,8%	18	34,0%	61	35,3%
autres substances (p.ex. la naltrexone)	4	3,3%	4	7,5%	8	4,6%
Total	120	100,0%	53	100,0%	173	100,0%
Missing	1		0		1	

Contribution à l'admission par ...

.....

A10 Pour 23% de la clientèle une institution spécialisée dans les problèmes d'addiction a été déterminante pour le début du traitement, 37% ont engagé le traitement principalement de leur propre initiative ou sur l'initiative de leur famille ou de leurs amis. Pour 19% c'était une mesure pénale ou administrative et pour 14 % des autres services médicales, sociales ou de santé ont été déterminante.

A10 Contribution à l'admission par... (vneb080)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
condamnation/ mesure pénale ou administrative/ autorités judiciaires/ police	74	21,0%	15	13,2%	89	19,1%
cabinet médical	11	3,1%	6	5,3%	17	3,6%
autre institution spécialisée dans les addictions	80	22,7%	27	23,7%	107	22,9%
autre service médical, social, ou de santé	40	11,3%	25	21,9%	65	13,9%
institution formatrice ou éducative	3	0,8%	1	0,9%	4	0,9%
aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: employeur	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: initiative personnelle, famille, amis, etc.	135	38,2%	37	32,5%	172	36,8%
autre	8	2,3%	3	2,6%	11	2,4%
Total	353	100,0%	114	100,0%	467	100,0%
Missing	21		6		27	

Motif à la base de la thérapie

.....

A11 50% des clients et clientes indiquent avoir été motivés pour entamer le traitement par leur volonté d'abstinence et par leur souhait de vivre sans drogue ni addiction. 16% souhaitent une structure de jour, de la stabilité ainsi qu'une vie réglée (journées structurées), normale et meilleure. 17% sont motivés par l'intégration professionnelle, la formation ou l'apprentissage. Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

A11 Motif à la base de la thérapie (plusieurs réponses: vyey020a-n)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
abstinence, vie sans drogue et addiction	réponses	159	43	202
	personnes %	51,8%	43,4%	49,8%
vie normale et réglée, journées structurées, stabilité	réponses	46	19	65
	personnes %	15,0%	19,2%	16,0%
intégration professionnelle, formation, apprentissage	réponses	55	12	67
	personnes %	17,9%	12,1%	16,5%
santé (physique, psychique), problèmes de santé	réponses	35	16	51
	personnes %	11,4%	16,2%	12,6%
autonomie, indépendance dans la vie	réponses	32	16	48
	personnes %	10,4%	16,2%	11,8%
connaissance de soi, travail sur soi-même	réponses	21	9	30
	personnes %	6,8%	9,1%	7,4%
nouveau départ, nouvelle vie, changer sa vie	réponses	39	10	49
	personnes %	12,7%	10,1%	12,1%
trouver le sens de sa vie; joie de vivre; être heureux	réponses	7	6	13
	personnes %	2,3%	6,1%	3,2%
mesure	réponses	11	3	14
	personnes %	3,6%	3,0%	3,4%
son propre enfant/ses propres enfants; être une bonne mère, un bon père, ne pas perdre la ...	réponses	21	20	41
	personnes %	6,8%	20,2%	10,1%
améliorer les relations avec la famille ou le/la partenaire	réponses	24	4	28
	personnes %	7,8%	4,0%	6,9%
autres motifs	réponses	41	7	48
	personnes %	13,4%	7,1%	11,8%
Total	réponses	491	165	656
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	307	99	406
	personnes %	159,9%	166,7%	161,6%
Missing		67	21	88

B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Logement

B1 24% des clients et clientes étaient principalement à l'hôpital ou en clinique durant les 30 jours précédant le début du traitement, 15% étaient en institution thérapeutique ou un foyer, 12% des clients étaient en prison, 16% logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux et 17% vivaient seuls.

B1 Ménage avec qui (principalement, au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en menage	57	15,7%	22	19,0%	79	16,5%
avec la famille d'origine	59	16,2%	19	16,4%	78	16,3%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfants)	24	6,6%	13	11,2%	37	7,7%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	24	6,6%	10	8,6%	34	7,1%
en prison	52	14,3%	7	6,0%	59	12,3%
institution thérapeutique/ foyer	51	14,0%	19	16,4%	70	14,6%
hôpital/ clinique	90	24,7%	25	21,6%	115	24,0%
autre	7	1,9%	1	0,9%	8	1,7%
Total	364	100,0%	116	100,0%	480	100,0%
Missing	10		4		14	

B2 Au cours des 6 mois précédant le début de la thérapie, 25% des clients et clientes vivaient principalement seuls; 16% logeaient chez leurs parents ou chez l'un des deux, 15% avec un-e partenaire et 16% dans une institution thérapeutique ou un foyer.

B2 Ménage avec qui (principalement, au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec065)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en menage	91	25,1%	29	25,0%	120	25,1%
avec la famille d'origine	63	17,4%	15	12,9%	78	16,3%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfants)	46	12,7%	25	21,6%	71	14,8%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	24	6,6%	11	9,5%	35	7,3%
en prison	46	12,7%	7	6,0%	53	11,1%
institution thérapeutique/ foyer	59	16,3%	19	16,4%	78	16,3%
hôpital/ clinique	27	7,4%	6	5,2%	33	6,9%
autre	7	1,9%	4	3,4%	11	2,3%
Total	363	100,0%	116	100,0%	479	100,0%
Missing	11		4		15	

B3 Au cours des 30 jours précédant le début du traitement, 40% des clients et clientes avaient un logement stable, 39% vivaient en institution thérapeutique ou un foyer. Au cours des 6 mois précédant le début du traitement, 56% de la clientèle avaient un logement stable et 23% étaient en institution thérapeutique ou un foyer (tab. **B4**).

B3 Type de domicile (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec070)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	140	38,6%	53	45,3%	193	40,2%
situation de logement instable et/ou sdf	27	7,4%	13	11,1%	40	8,3%
en prison	52	14,3%	7	6,0%	59	12,3%
institution thérapeutique/ foyer/hôpital/clinique	144	39,7%	44	37,6%	188	39,2%
Total	363	100,0%	117	100,0%	480	100,0%
Missing	11		3		14	

B4 Type de domicile (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec075)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	207	57,3%	59	51,8%	266	56,0%
situation de logement instable et/ou sdf	22	6,1%	23	20,2%	45	9,5%
en prison	46	12,7%	7	6,1%	53	11,2%
institution thérapeutique/ foyer/hôpital/clinique	86	23,8%	25	21,9%	111	23,4%
Total	361	100,0%	114	100,0%	475	100,0%
Missing	13		6		19	

Relations

.....

B5 31% des clients et clientes ont des enfants. Seulement 20% habitent avec leur(s) enfant(s) (tab. **B7**).

B5 Avez-vous des enfants (biologiques ou adoptés)? (vnec067)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, aucun	256	72,7%	67	58,3%	323	69,2%
oui	96	27,3%	48	41,7%	144	30,8%
Total	352	100,0%	115	100,0%	467	100,0%
Missing	22		5		27	

B6 Nombre d'enfants sous-groupe: enfants oui (vzes030)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
1 enfant	61	64,2%	28	59,6%	89	62,7%
2 enfants	23	24,2%	13	27,7%	36	25,4%
3 enfants ou plus	11	11,6%	6	12,8%	17	12,0%
Total	95	100,0%	47	100,0%	142	100,0%
Missing	1		1		2	

B7 Habitez-vous avec votre enfant/ vos enfants? (vnec068)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	81	87,1%	29	64,4%	110	79,7%
oui	12	12,9%	16	35,6%	28	20,3%
Total	93	100,0%	45	100,0%	138	100,0%
Missing	3		3		6	

B8 53% des clients n'étaient pas en couple les 6 mois précédant le début du traitement. La proportion de femmes seules (38%) durant cette période est significativement plus basse que celle des hommes (58%; Cr's V=.19; $p < .001$). Parmi les personnes ayant une relation stable, 49% indiquent que leur partenaire a également connu des problèmes d'addiction au cours des 6 mois précédant le début de leur traitement (tab. **B9**). Le (ou la) partenaire d'une femme vivant en couple est significativement plus souvent lui-même dépendant d'une drogue (68%) que celle (ou celui) d'un homme (39%; Cr's V = .28; $p < .001$)

B8 Type de relation de couple (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vzes010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire	207	58,0%	43	38,1%	250	53,2%
relation(s) temporaire(s)	52	14,6%	17	15,0%	69	14,7%
partenaire fixe en vivant séparé-e	54	15,1%	30	26,5%	84	17,9%
partenaire fixe en ménage commun	44	12,3%	23	20,4%	67	14,3%
Total	357	100,0%	113	100,0%	470	100,0%
Missing	17		7		24	

B9 Problèmes de dépendance du partenaire, sous-groupe: partenaire fixe (vzes015)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non	53	60,9%	14	31,8%	67	51,1%
oui	34	39,1%	30	68,2%	64	48,9%
Total	87	100,0%	44	100,0%	131	100,0%
Missing	11		9		20	

Formation

.....

B10 À leur admission, 46% des clients et clientes disposent d'une formation professionnelle de base ou d'un apprentissage.

B10 Formation achevée avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme (plusieurs réponses: vnec120y-vnec120h)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS	
		hommes	femmes		
	aucune ou école obligatoire inachevée	réponses	31	8	39
		personnes %	8,6%	7,2%	8,2%
	école obligatoire	réponses	272	87	359
		personnes %	75,1%	78,4%	75,9%
	formation de transition	réponses	28	17	45
		personnes %	7,7%	15,3%	9,5%
	formation générale sans maturité	réponses	18	9	27
		personnes %	5,0%	8,1%	5,7%
	formation professionnelle de base et apprentissage	réponses	172	46	218
		personnes %	47,5%	41,4%	46,1%
	maturité ou école normale	réponses	14	8	22
		personnes %	3,9%	7,2%	4,7%
	formation professionnelle supérieure	réponses	11	3	14
		personnes %	3,0%	2,7%	3,0%
	haute école spécialisée et université	réponses	10	2	12
		personnes %	2,8%	1,8%	2,5%
	doctorat et habilitation	réponses	0	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
Total	réponses	556	180	736	
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%	
	nombre de personnes	362	111	473	
	personnes %	153,6%	162,2%	155,6%	
Missing		12	9	21	

B11 À leur admission, 43% des clients et clientes disposent d'une formation professionnelle de base ou d'un apprentissage (niveau de formation le plus élevé), 33% ont achevé l'école obligatoire.

B11 Niveau de formation le plus élevé (avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme) (vnec12a-vnec120h)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune ou école obligatoire inachevée	31	8,6%	7	6,3%	38	8,0%
école obligatoire	121	33,4%	36	32,4%	157	33,2%
formation de transition	14	3,9%	10	9,0%	24	5,1%
formation générale sans maturité	8	2,2%	4	3,6%	12	2,5%
formation professionnelle de base et apprentissage	160	44,2%	43	38,7%	203	42,9%
maturité ou école normale	7	1,9%	7	6,3%	14	3,0%
formation professionnelle supérieure	11	3,0%	2	1,8%	13	2,7%
haute école spécialisée et université	10	2,8%	2	1,8%	12	2,5%
Total	362	100,0%	111	100,0%	473	100,0%
Missing	12		9		21	

Principale source de revenu

.....

B12 L'aide sociale était la source principale de revenu de 53% des clients et clientes au cours des 30 jours précédant le début du traitement. Pour 13%, le revenu principal provenait d'une rente et pour 8% d'une activité lucrative.

B12 Principale source de revenu (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec080)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
salaire	28	7,8%	8	6,9%	36	7,5%
économies	6	1,7%	2	1,7%	8	1,7%
rente (AVS, AI, autres types de prévoyance)	49	13,6%	15	12,9%	64	13,4%
aide sociale	183	50,7%	70	60,3%	253	53,0%
assurance-chômage	6	1,7%	1	0,9%	7	1,5%
soutien partenaire	0	0,0%	3	2,6%	3	0,6%
soutien parents, autres membres de la famille, ami-e-s	31	8,6%	7	6,0%	38	8,0%
deal, petit trafic	12	3,3%	0	0,0%	12	2,5%
autres revenus illég.	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
prostitution	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
assurance d'indemnités journalières	11	3,0%	3	2,6%	14	2,9%
autre: détention préventive, emprisonnement	28	7,8%	5	4,3%	33	6,9%
autre: justice	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
autre: div.	3	0,8%	2	1,7%	5	1,0%
Total	361	100,0%	116	100,0%	477	100,0%
Missing	13		4		17	

B13 Pour 46% de la clientèle, la source principale de revenu au cours des 6 mois précédant l'admission était l'aide sociale, pour 13%, le revenu principal provenait d'une rente et pour 15% d'une activité lucrative.

B13 Principale source de revenu (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec090)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
salaire	58	16,1%	14	12,1%	72	15,1%
économies	3	0,8%	3	2,6%	6	1,3%
rente (AVS, AI, autres types de prévoyance)	49	13,6%	15	12,9%	64	13,4%
aide sociale	164	45,6%	56	48,3%	220	46,2%
assurance-chômage	6	1,7%	3	2,6%	9	1,9%
soutien partenaire	3	0,8%	5	4,3%	8	1,7%
soutien parents, autres membres de la famille, ami-e-s	27	7,5%	8	6,9%	35	7,4%
deal, petit trafic	12	3,3%	2	1,7%	14	2,9%
autres revenus illég.	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
prostitution	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
assurance d'indemnités journalières	9	2,5%	2	1,7%	11	2,3%
autre: détention préventive, emprisonnement	22	6,1%	5	4,3%	27	5,7%
autre: justice	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
autre: div.	5	1,4%	2	1,7%	7	1,5%
Total	360	100,0%	116	100,0%	476	100,0%
Missing	14		4		18	

Activité rémunératrice

.....

B14 Pendant les 30 jours précédant l'admission, 39% des personnes n'avaient pas de travail (car sans espoir d'en trouver un), 17% étaient en incapacité de travail (AI, indemnités journalières), 11% étaient sans activité lucrative mais en recherche d'emploi et 12% travaillaient à temps partiel ou à temps plein ou avaient des emplois occasionnels.

B14 Activité rémunératrice (au cours des 30 jours précédant l'admission) (vnec100)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	23	6,4%	6	5,2%	29	6,1%
à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	4	1,1%	5	4,3%	9	1,9%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	18	5,0%	2	1,7%	20	4,2%
en formation (école, études, apprentissage)	17	4,7%	5	4,3%	22	4,6%
sans travail, en quête	41	11,3%	12	10,3%	53	11,1%
sans travail, sans recherche car sans espoir d'en trouver un	143	39,5%	41	35,3%	184	38,5%
rentier, rentière (retraite, AVS, économies)	5	1,4%	2	1,7%	7	1,5%
incapacité de travail (AI, indemnités journalières)	58	16,0%	21	18,1%	79	16,5%
femme, homme au foyer	0	0,0%	7	6,0%	7	1,5%
autre: atelier protégé, mesure pour soutenir l'emploi, stage	6	1,7%	0	0,0%	6	1,3%
autre: détention préventive, emprisonnement	27	7,5%	3	2,6%	30	6,3%
autre: institution	4	1,1%	4	3,4%	8	1,7%
autre: aide sociale	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
autre: div.	15	4,1%	7	6,0%	22	4,6%
Total	362	100,0%	116	100,0%	478	100,0%
Missing	12		4		16	

B15 Au cours des 6 mois précédant leur admission, 31% des clients et clientes n'avaient pas d'activité professionnelle (car sans espoir d'un trouver un), 13% étaient en incapacité de travail (AI, indemnités journalières) et 12% étaient en recherche d'emploi, 24% avaient une activité professionnelle (plein temps, temps partiel ou emplois occasionnels).

B15 Activité rémunératrice (au cours des 6 mois précédant l'admission) (vnec110)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	48	13,2%	8	7,0%	56	11,7%
à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	21	5,8%	8	7,0%	29	6,1%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	26	7,2%	5	4,3%	31	6,5%
en formation (école, études, apprentissage)	22	6,1%	5	4,3%	27	5,6%
sans travail, en quête	38	10,5%	18	15,7%	56	11,7%
sans travail, sans recherche car sans espoir d'en trouver un	113	31,1%	33	28,7%	146	30,5%
rentier, rentière (retraite, AVS, économies)	4	1,1%	2	1,7%	6	1,3%
incapacité de travail (AI, indemnités journalières)	47	12,9%	17	14,8%	64	13,4%
femme, homme au foyer	0	0,0%	7	6,1%	7	1,5%
autre: atelier protégé, mesure pour soutenir l'emploi, stage	8	2,2%	2	1,7%	10	2,1%
autre: détention préventive, emprisonnement	20	5,5%	3	2,6%	23	4,8%
autre: institution	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
autre: aide sociale	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
autre: div.	13	3,6%	6	5,2%	19	4,0%
Total	363	100,0%	115	100,0%	478	100,0%
Missing	11		5		16	

B16 18% des clients et clientes ne sont pas endettés au début du traitement; 29% ont des dettes égales ou supérieures à 25 000 francs. 28% des femmes ne sont pas endettées. Ce taux est significativement plus élevé que pour les hommes, qui sont 16% dans ce cas, et si elles sont endettées, c'est de manière significativement plus rare pour des montants élevés: 11% des femmes contre 34% des hommes ont des dettes égales ou supérieures à 25 001 francs (Cr' V=.28, $p<.001$).

B16 Dettes au moment de l'admission (vyef040)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
dettes pour un montant inconnu	43	13,0%	16	17,0%	59	13,9%
aucune dette	52	15,8%	26	27,7%	78	18,4%
jusqu'à 5000 CHF	30	9,1%	14	14,9%	44	10,4%
de 5001 à 10 000 CHF	44	13,3%	13	13,8%	57	13,4%
de 10 001 à 25 000 CHF	50	15,2%	15	16,0%	65	15,3%
de 25 001 à 50 000 CHF	47	14,2%	5	5,3%	52	12,3%
de 50 001 à 100 000 CHF	32	9,7%	4	4,3%	36	8,5%
plus de 100 000 CHF	32	9,7%	1	1,1%	33	7,8%
Total	330	100,0%	94	100,0%	424	100,0%
Missing	44		26		70	

Situation juridique: mesures , procédures en cours, décisions

B17 59% de la clientèle a déjà fait l'objet d'une condamnation.
La proportion est significativement plus haute pour les hommes (66%) que pour les femmes (38%; Cr' V=.24; p<.000).

B17 Condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues? (vyer010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, aucune condamnation	118	34,2%	67	62,0%	185	40,8%
oui	227	65,8%	41	38,0%	268	59,2%
Total	345	100,0%	108	100,0%	453	100,0%
Missing	29		12		41	

B18 69% des clients et clientes condamnés l'ont été pour des infractions liées aux stupéfiants. Cette catégorie comprend la production, la possession, la diffusion, l'importation et l'exportation de drogues. 43% de la clientèle a été condamnée pour des délits commis dans le but de se procurer des stupéfiants, tels que le vol, le recel, la falsification d'ordonnance et le brigandage. 43% a été condamnée pour des infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (p. ex. infractions routières, dommages corporels). Il est possible de donner plusieurs réponses à cette question.

B18 Condamnation pénale pour..., sous-groupe: déjà été condamné-e (plusieurs réponses: vyer011a-e)

			Sexe		TOTAL act-info-FOS
			hommes	femmes	
·	suspension de la procédure au profit de mesures	réponses	7	2	9
		personnes %	3,1%	4,9%	3,4%
	infraction à la loi sur les stupéfiants (p.ex. production, possession, diffusion)	réponses	155	29	184
		personnes %	69,2%	70,7%	69,4%
	infractions dans le but de se procurer des drogues (p.ex. vol, recel, fraude)	réponses	99	15	114
		personnes %	44,2%	36,6%	43,0%
	infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues, de médicaments	réponses	101	12	113
		personnes %	45,1%	29,3%	42,6%
	autres délits	réponses	19	4	23
		personnes %	8,5%	9,8%	8,7%
	Total	réponses	381	62	443
		réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
Total	nombre de personnes		224	41	265
	personnes %		170,1%	151,2%	167,2%
Missing			3	0	3

B19 45% des clients et clientes ont déjà été en prison et/ou en détention préventive. Les femmes (71%) sont significativement moins nombreuses que les hommes (50%) dans ce cas (Cr'sV=.18, p<.01).

B19 Emprisonnement ou détention préventive (vzer020)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui, emprisonnement	55	16,0%	10	9,9%	65	14,6%
oui, détention préventive	58	16,9%	10	9,9%	68	15,3%
oui, emprisonnement et détention préventive	60	17,4%	9	8,9%	69	15,5%
non, jamais	171	49,7%	72	71,3%	243	54,6%
Total	344	100,0%	101	100,0%	445	100,0%
Missing	30		19		49	

B20 Durée du séjour en prison/détention préventive, sous-groupe: déjà en prison/détention (vzer030)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois	18	12,9%	2	8,3%	20	12,2%
1 à 2 mois	27	19,3%	8	33,3%	35	21,3%
2,50	0	0,0%	1	4,2%	1	0,6%
plus de 2 jusqu'à 6 mois	26	18,6%	4	16,7%	30	18,3%
plus de 6 jusqu'à 12 mois	21	15,0%	1	4,2%	22	13,4%
plus de 12 mois	48	34,3%	8	33,3%	56	34,1%
Total	140	100,0%	24	100,0%	164	100,0%
Missing	33		5		38	

B21 Pour 19% des clients et clientes, une mesure pénale ou administrative est à l'origine du traitement. Suspension de la procédure (renoncement à infliger une peine, réprimande art. 19a ch. 2 LStup y compris). Il n'y a pas de différence significative entre les sexes.

B21 Le traitement est-il consécutif à une mesure judiciaire? (vyer040)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
non, pas de mesure	285	78,9%	90	85,7%	375	80,5%
suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art. 19a ch. 2 LStup)	3	0,8%	0	0,0%	3	0,6%
oui, consécutif à une mesure	73	20,2%	15	14,3%	88	18,9%
Total	361	100,0%	105	100,0%	466	100,0%
Missing	13		15		28	

B22 Pour 68% des clients et clientes, les bases juridiques sont des traitements institutionnels des addictions au sens de l'article 60 CP. 23% ont reçu une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP.

B22 De quelle mesure judiciaire s'agit-il? sous-groupe: mesures (plusieurs réponses: vyer041a-g)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
	abandon de la poursuite pénale en cas de soumission à des mesures de protection contrôlées par un médecin (art. 19a ch. 3 LStup)	réponses	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%
	mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	réponses	14	20
		personnes %	19,4%	23,0%
	traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	réponses	50	59
		personnes %	69,4%	67,8%
	prise en charge ambulatoire	réponses	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%
	placement dans une institution pour jeunes adultes	réponses	2	2
		personnes %	2,8%	2,3%
	en attente d'un jugement	réponses	8	10
		personnes %	11,1%	11,5%
	autre	réponses	5	7
		personnes %	6,9%	8,0%
Total	réponses	79	19	98
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	72	15	87
	personnes %	109,7%	126,7%	112,6%
Missing		1	0	1

C CONSOMMATIONS et DÉPENDANCE

C1 Problème principal: substance ou comportement comparable à une dépendance (vmed005)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
substance(s)	360	99,2%	114	98,3%	474	99,0%
comportement comparable à une dép.	3	0,8%	2	1,7%	5	1,0%
Total	363	100,0%	116	100,0%	479	100,0%
Missing	11		4		15	

C2 Lorsqu'on leur demande quelles substances leur posent problème au début du traitement, 57% des clients et clientes répondent la cocaïne, 43% l'héroïne, 49% l'alcool, et 19% des benzodiazépines hors prescription. Pour 42% des personnes, le cannabis pose également problème, et le tabac est une substance problématique pour 48%.

C2 Quelles substances sont un problème pour vous (incl. principale substance)? (plusieurs réponses: VNED070y-kd)

			Sexe		TOTAL act-info-FOS
			hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses		3	2	5
	personnes %		0,8%	1,7%	1,0%
alcool	réponses		182	56	238
	personnes %		49,3%	47,5%	48,9%
héroïne	réponses		163	47	210
	personnes %		44,2%	39,8%	43,1%
méthadone (sans prescription)	réponses		31	7	38
	personnes %		8,4%	5,9%	7,8%
buprénorphine (sans prescription)	réponses		2	0	2
	personnes %		0,5%	0,0%	0,4%
fentanyl (sans prescription)	réponses		0	0	0
	personnes %		0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes	réponses		10	6	16
	personnes %		2,7%	5,1%	3,3%
cocaïne	réponses		212	63	275
	personnes %		57,5%	53,4%	56,5%
crack	réponses		32	11	43
	personnes %		8,7%	9,3%	8,8%
autres formes de cocaïne	réponses		7	1	8
	personnes %		1,9%	0,8%	1,6%
amphétamines	réponses		53	17	70
	personnes %		14,4%	14,4%	14,4%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules Thai)	réponses		20	10	30
	personnes %		5,4%	8,5%	6,2%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses		44	15	59
	personnes %		11,9%	12,7%	12,1%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses		2	1	3
	personnes %		0,5%	0,8%	0,6%

C2 Quelles substances sont un problème pour vous (incl. principale substance)? (plusieurs réponses: VNED070y-kd)

(Fort.)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
autres stimulants	réponses	1	3	4
	personnes %	0,3%	2,5%	0,8%
barbituriques (sans prescription)	réponses	5	2	7
	personnes %	1,4%	1,7%	1,4%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	59	31	90
	personnes %	16,0%	26,3%	18,5%
GHB/GBL	réponses	11	4	15
	personnes %	3,0%	3,4%	3,1%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	5	7	12
	personnes %	1,4%	5,9%	2,5%
LSD	réponses	37	8	45
	personnes %	10,0%	6,8%	9,2%
kétamine	réponses	8	4	12
	personnes %	2,2%	3,4%	2,5%
autres hallucinogènes	réponses	10	3	13
	personnes %	2,7%	2,5%	2,7%
substances volatiles	réponses	6	1	7
	personnes %	1,6%	0,8%	1,4%
cannabis	réponses	167	39	206
	personnes %	45,3%	33,1%	42,3%
tabac	réponses	181	53	234
	personnes %	49,1%	44,9%	48,0%
autres substances (tous types)	réponses	5	1	6
	personnes %	1,4%	0,8%	1,2%
troubles comparables à une addiction	réponses	18	9	27
	personnes %	4,9%	7,6%	5,5%
Total	réponses	1274	401	1675
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	369	118	487
	personnes %	345,3%	339,8%	343,9%
Missing		5	2	7

C2.1 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème ALCOOL (vned070a, vned73a)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	62	37,8%	17	35,4%	79	37,3%
4-6 jours par semaine	15	9,1%	8	16,7%	23	10,8%
2-3 jours par semaine	30	18,3%	4	8,3%	34	16,0%
1 jour par semaine ou moins	19	11,6%	8	16,7%	27	12,7%
aucune consommation	38	23,2%	11	22,9%	49	23,1%
Total	164	100,0%	48	100,0%	212	100,0%
Missing	18		8		26	

C2.2 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème HÉROÏNE, sans prescription (vned070ba, vned073ba)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	37	25,9%	10	26,3%	47	26,0%
4-6 jours par semaine	13	9,1%	3	7,9%	16	8,8%
2-3 jours par semaine	17	11,9%	2	5,3%	19	10,5%
1 jour par semaine ou moins	23	16,1%	3	7,9%	26	14,4%
aucune consommation	53	37,1%	20	52,6%	73	40,3%
Total	143	100,0%	38	100,0%	181	100,0%
Missing	20		9		29	

C2.3 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MÉTHADONE, sans prescription (vned070bb, vned073bb)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	18	58,1%	3	50,0%	21	56,8%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	2	6,5%	1	16,7%	3	8,1%
1 jour par semaine ou moins	2	6,5%	0	0,0%	2	5,4%
aucune consommation	9	29,0%	2	33,3%	11	29,7%
Total	31	100,0%	6	100,0%	37	100,0%
Missing	0		1		1	

C2.4 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BUPRÉNORPHINE, sans prescription (vned070bc, vned073bc)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	50,0%	0	0,0%	1	50,0%
Total	2	100,0%	0	0,0%	2	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.6 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres OPIOÏDES, sans prescription (vned070be, vned073be)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	4	40,0%	2	33,3%	6	37,5%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	2	33,3%	2	12,5%
aucune consommation	6	60,0%	2	33,3%	8	50,0%
Total	10	100,0%	6	100,0%	16	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.7 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème COCAÏNE (vned070ca, vned073ca)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	31	16,9%	8	15,4%	39	16,6%
4-6 jours par semaine	19	10,4%	8	15,4%	27	11,5%
2-3 jours par semaine	25	13,7%	5	9,6%	30	12,8%
1 jour par semaine ou moins	44	24,0%	8	15,4%	52	22,1%
aucune consommation	64	35,0%	23	44,2%	87	37,0%
Total	183	100,0%	52	100,0%	235	100,0%
Missing	29		11		40	

C2.8 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CRACK (vned070cb, vned073cb)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	6	20,0%	1	10,0%	7	17,5%
4-6 jours par semaine	2	6,7%	1	10,0%	3	7,5%
2-3 jours par semaine	6	20,0%	1	10,0%	7	17,5%
1 jour par semaine ou moins	6	20,0%	3	30,0%	9	22,5%
aucune consommation	10	33,3%	4	40,0%	14	35,0%
Total	30	100,0%	10	100,0%	40	100,0%
Missing	2		1		3	

C2.9 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres formes de COCAÏNE (vned070cc, vned073cc)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	28,6%	0	0,0%	2	25,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	2	28,6%	0	0,0%	2	25,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	1	100,0%	1	12,5%
aucune consommation	3	42,9%	0	0,0%	3	37,5%
Total	7	100,0%	1	100,0%	8	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.10 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème AMPHÉTAMINES (vned070da, vned073da)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	4	8,3%	3	17,6%	7	10,8%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	5,9%	1	1,5%
2-3 jours par semaine	8	16,7%	2	11,8%	10	15,4%
1 jour par semaine ou moins	10	20,8%	5	29,4%	15	23,1%
aucune consommation	26	54,2%	6	35,3%	32	49,2%
Total	48	100,0%	17	100,0%	65	100,0%
Missing	5		0		5	

C2.11 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MÉTAMPHÉTAMINES (vned070db, vned073db)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	11,1%	1	10,0%	3	10,7%
4-6 jours par semaine	1	5,6%	1	10,0%	2	7,1%
2-3 jours par semaine	2	11,1%	1	10,0%	3	10,7%
1 jour par semaine ou moins	3	16,7%	2	20,0%	5	17,9%
aucune consommation	10	55,6%	5	50,0%	15	53,6%
Total	18	100,0%	10	100,0%	28	100,0%
Missing	2		0		2	

C2.12 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème MDMA (vned070dc, vned073dc)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	2,4%	0	0,0%	1	1,8%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	6,7%	1	1,8%
2-3 jours par semaine	4	9,8%	0	0,0%	4	7,1%
1 jour par semaine ou moins	13	31,7%	5	33,3%	18	32,1%
aucune consommation	23	56,1%	9	60,0%	32	57,1%
Total	41	100,0%	15	100,0%	56	100,0%
Missing	3		0		3	

C2.13 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CATHINONES (vned070dd, vned073dd)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	1	50,0%	0	0,0%	1	33,3%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	50,0%	1	100,0%	2	66,7%
Total	2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.14 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres STIMULANTS (vned070de, vned073de)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	100,0%	1	50,0%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
aucune consommation	1	100,0%	0	0,0%	1	50,0%
Total	1	100,0%	1	100,0%	2	100,0%
Missing	0		2		2	

C2.15 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BARBITURIQUES (vned070ea, vned073ea)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	20,0%	0	0,0%	1	14,3%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	50,0%	1	14,3%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	1	20,0%	0	0,0%	1	14,3%
aucune consommation	3	60,0%	1	50,0%	4	57,1%
Total	5	100,0%	2	100,0%	7	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.16 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème BENZODIAZÉPINES (vned070eb, vned073eb)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	22	41,5%	12	44,4%	34	42,5%
4-6 jours par semaine	3	5,7%	2	7,4%	5	6,3%
2-3 jours par semaine	6	11,3%	3	11,1%	9	11,3%
1 jour par semaine ou moins	8	15,1%	6	22,2%	14	17,5%
aucune consommation	14	26,4%	4	14,8%	18	22,5%
Total	53	100,0%	27	100,0%	80	100,0%
Missing	6		4		10	

C2.17 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème GHB/ GBL (vned070ec, vned073ec)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	9,1%	0	0,0%	1	7,1%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	33,3%	1	7,1%
2-3 jours par semaine	1	9,1%	0	0,0%	1	7,1%
1 jour par semaine ou moins	4	36,4%	0	0,0%	4	28,6%
aucune consommation	5	45,5%	2	66,7%	7	50,0%
Total	11	100,0%	3	100,0%	14	100,0%
Missing	0		1		1	

C2.18 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autre SOMNIFÈRES (vned070ed, vned073ed)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	25,0%	4	57,1%	5	45,5%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	14,3%	1	9,1%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	2	50,0%	2	28,6%	4	36,4%
aucune consommation	1	25,0%	0	0,0%	1	9,1%
Total	4	100,0%	7	100,0%	11	100,0%
Missing	1		0		1	

C2.19 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème LSD (vned070fa, vned073fa)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	2,8%	1	12,5%	2	4,5%
4-6 jours par semaine	1	2,8%	1	12,5%	2	4,5%
2-3 jours par semaine	4	11,1%	0	0,0%	4	9,1%
1 jour par semaine ou moins	12	33,3%	3	37,5%	15	34,1%
aucune consommation	18	50,0%	3	37,5%	21	47,7%
Total	36	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
Missing	1		0		1	

C2.20 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème KÉTAMINE (vned070fb, vned073fb)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	25,0%	1	8,3%
2-3 jours par semaine	1	12,5%	0	0,0%	1	8,3%
1 jour par semaine ou moins	4	50,0%	1	25,0%	5	41,7%
aucune consommation	3	37,5%	2	50,0%	5	41,7%
Total	8	100,0%	4	100,0%	12	100,0%
Missing	0		0		0	

C2.21 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème autres HALLUCINOGENES (vned070fc, vned073fc)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	1	10,0%	0	0,0%	1	8,3%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	50,0%	1	8,3%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	3	30,0%	1	50,0%	4	33,3%
aucune consommation	6	60,0%	0	0,0%	6	50,0%
Total	10	100,0%	2	100,0%	12	100,0%
Missing	0		1		1	

C2.22 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème SUBSTANCES VOLATILES (vned070g, vned073g)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	1	100,0%	1	16,7%
2-3 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1 jour par semaine ou moins	1	20,0%	0	0,0%	1	16,7%
aucune consommation	4	80,0%	0	0,0%	4	66,7%
Total	5	100,0%	1	100,0%	6	100,0%
Missing	1		0		1	

C2.23 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème CANNABIS (vned070h, vned073h)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	54	36,2%	14	37,8%	68	36,6%
4-6 jours par semaine	17	11,4%	5	13,5%	22	11,8%
2-3 jours par semaine	22	14,8%	3	8,1%	25	13,4%
1 jour par semaine ou moins	15	10,1%	10	27,0%	25	13,4%
aucune consommation	41	27,5%	5	13,5%	46	24,7%
Total	149	100,0%	37	100,0%	186	100,0%
Missing	18		2		20	

C2.24 Fréquence de consommation (derniers 30 jours), sous-groupe: problème TABAC (vned070i, vned073i)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	161	97,0%	48	98,0%	209	97,2%
4-6 jours par semaine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2-3 jours par semaine	1	0,6%	0	0,0%	1	0,5%
1 jour par semaine ou moins	1	0,6%	0	0,0%	1	0,5%
aucune consommation	3	1,8%	1	2,0%	4	1,9%
Total	166	100,0%	49	100,0%	215	100,0%
Missing	15		4		19	

Principale substance posant problème à l'admission

.....

C3 En ce qui concerne la clientèle en traitement pour un problème lié à une substance, le problème principal au moment de l'admission est, pour 29%, la cocaïne; pour 23% il s'agit de l'héroïne et pour 21% c'est l'alcool.

C3 Principale substance posant problème, liste détaillée (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
alcool	75	20,7%	24	20,7%	99	20,7%
héroïne	88	24,2%	22	19,0%	110	23,0%
méthadone (sans prescription)	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
buprénorphine (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
fentanyl (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres opioïdes	0	0,0%	1	0,9%	1	0,2%
cocaïne	107	29,5%	32	27,6%	139	29,0%
crack	5	1,4%	2	1,7%	7	1,5%
autres formes de cocaïne	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
amphétamines	7	1,9%	3	2,6%	10	2,1%
métamphétamines (crystal meth, autre)	5	1,4%	4	3,4%	9	1,9%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cathinones de syn. (MDPV, méphédron, autre)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres stimulants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
barbituriques (sans prescription)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	10	2,8%	7	6,0%	17	3,5%
GHB/GBL	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
autres somnifères, tranquillisants	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
LSD	2	0,6%	1	0,9%	3	0,6%
kétamine	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autres hallucinogènes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
substances volatiles	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
cannabis	54	14,9%	14	12,1%	68	14,2%
tabac	3	0,8%	3	2,6%	6	1,3%
autres substances (tous types)	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
troubles comparables à une addiction	3	0,8%	2	1,7%	5	1,0%
Total	363	100,0%	116	100,0%	479	100,0%
Missing	11		4		15	

C4 Conformément aux principes d'act-info, les substances sont réparties par groupes. Pour 31% des personnes, la substance posant le plus problème est la cocaïne et ses dérivés. 23% nomment les opioïdes (héroïne, méthadone, morphine, codéine, etc.) et 21% citent l'alcool. Tous les tableaux qui suivent, relatifs à la fréquence de consommation, à l'âge de la première consommation, etc. sont basés sur ces groupes de substances.

C4 Principale substance posant problème, catégorisée selon les conventions act-info (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
alcool	75	20,7%	24	20,7%	99	20,7%
opioïdes	88	24,2%	24	20,7%	112	23,4%
cocaïne	113	31,1%	34	29,3%	147	30,7%
stimulants	12	3,3%	7	6,0%	19	4,0%
somnifères, tranquillisants	12	3,3%	7	6,0%	19	4,0%
hallucinogènes	2	0,6%	1	0,9%	3	0,6%
cannabis	54	14,9%	14	12,1%	68	14,2%
tabac	3	0,8%	3	2,6%	6	1,3%
autres substances	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
troubles comparables à une addiction	3	0,8%	2	1,7%	5	1,0%
Total	363	100,0%	116	100,0%	479	100,0%
Missing	11		4		15	

Polytoxicomanie

.....

C5 Pour 44% des clients et clientes, il existe un trouble dû à la consommation de multiples substances selon le CIM-10. Une association souvent citée est l'association des opioïdes et de la cocaïne (12%) (tab. **C6b**).

C5 Troubles liés à l'utilisation de drogues multiples selon le CIM-10 ("polytoxicomanie") (vned015)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	140	42,7%	49	47,6%	189	43,9%
non	188	57,3%	54	52,4%	242	56,1%
Total	328	100,0%	103	100,0%	431	100,0%
Missing	46		17		63	

C6a Combinaison de substances: sous-groupe polytoxicomanie (plusieurs réponses: vned016a-j)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
alcool	réponses	74	25	99
	personnes %	53,2%	53,2%	53,2%
opioïdes	réponses	78	24	102
	personnes %	56,1%	51,1%	54,8%
cocaïne	réponses	100	31	131
	personnes %	71,9%	66,0%	70,4%
stimulants	réponses	20	11	31
	personnes %	14,4%	23,4%	16,7%
somnifères, tranquillisants	réponses	41	18	59
	personnes %	29,5%	38,3%	31,7%
hallucinogènes	réponses	9	5	14
	personnes %	6,5%	10,6%	7,5%
substances volatiles	réponses	1	0	1
	personnes %	0,7%	0,0%	0,5%
cannabis	réponses	54	15	69
	personnes %	38,8%	31,9%	37,1%
tabac	réponses	38	12	50
	personnes %	27,3%	25,5%	26,9%
autres substances	réponses	1	0	1
	personnes %	0,7%	0,0%	0,5%
Total	réponses	416	141	557
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	139	47	186
	personnes %	299,3%	300,0%	299,5%
Missing		1	2	3

C6b Combinaisons de substances (vned016a-j)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
opioïdes et cocaïne	18	12,9%	5	10,4%	23	12,3%
opioïdes, cocaïne et somnifères/tranquillisants	8	5,8%	5	10,4%	13	7,0%
alcool, opioïdes et cocaïne	13	9,4%	4	8,3%	17	9,1%
alcool et cocaïne	14	10,1%	4	8,3%	18	9,6%
alcool et cannabis	4	2,9%	2	4,2%	6	3,2%
cocaïne et cannabis	5	3,6%	2	4,2%	7	3,7%
substances div.: alcool, opioïdes, cocaïne, somnifères, tranquillisants, autre	7	5,0%	2	4,2%	9	4,8%
autre combinaison	70	50,4%	24	50,0%	94	50,3%
Total	139	100,0%	48	100,0%	187	100,0%
Missing	1		1		2	

C7 Problème principal selon des catégories d'âge à l'entrée, sans valeurs missing d'âge (vned010, vmec020)

TOTAL act-info-FOS

	jusqu'à 19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-39 ans		40 ans et plus		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	5	1,0%	7	1,5%	13	2,7%	34	7,1%	39	8,2%	98	20,5%
opioïdes	1	0,2%	7	1,5%	18	3,8%	47	9,8%	39	8,2%	112	23,4%
cocaïne	5	1,0%	13	2,7%	36	7,5%	58	12,1%	35	7,3%	147	30,8%
stimulants	2	0,4%	0	0,0%	5	1,0%	9	1,9%	3	0,6%	19	4,0%
somnifères, tranquillisants	0	0,0%	2	0,4%	4	0,8%	8	1,7%	5	1,0%	19	4,0%
hallucinogènes	2	0,4%	1	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,6%
cannabis	20	4,2%	23	4,8%	16	3,3%	7	1,5%	2	0,4%	68	14,2%
tabac	2	0,4%	1	0,2%	0	0,0%	2	0,4%	1	0,2%	6	1,3%
autres substances	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%	1	0,2%
troubles comparables à une addiction	0	0,0%	2	0,4%	0	0,0%	2	0,4%	1	0,2%	5	1,0%
Total	37	7,7%	56	11,7%	92	19,2%	167	34,9%	126	26,4%	478	100,0%

Problème principal: fréquence de la consommation

.....

C8 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	39	58,2%	13	61,9%	52	59,1%
4-6 jours par semaine	5	7,5%	3	14,3%	8	9,1%
2-3 jours par semaine	6	9,0%	1	4,8%	7	8,0%
1 jour par semaine ou moins	11	16,4%	3	14,3%	14	15,9%
aucune consommation	6	9,0%	1	4,8%	7	8,0%
Total	67	100,0%	21	100,0%	88	100,0%
Missing	8		3		11	

C9 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	32	40,0%	14	66,7%	46	45,5%
4-6 jours par semaine	14	17,5%	4	19,0%	18	17,8%
2-3 jours par semaine	12	15,0%	2	9,5%	14	13,9%
1 jour par semaine ou moins	13	16,3%	1	4,8%	14	13,9%
aucune consommation	9	11,3%	0	0,0%	9	8,9%
Total	80	100,0%	21	100,0%	101	100,0%
Missing	8		3		11	

C10 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	29	28,4%	9	31,0%	38	29,0%
4-6 jours par semaine	20	19,6%	8	27,6%	28	21,4%
2-3 jours par semaine	25	24,5%	2	6,9%	27	20,6%
1 jour par semaine ou moins	16	15,7%	6	20,7%	22	16,8%
aucune consommation	12	11,8%	4	13,8%	16	12,2%
Total	102	100,0%	29	100,0%	131	100,0%
Missing	11		5		16	

C11 Fréquence de consommation (derniers 6 mois), sous-groupe: problème principal CANNABIS (vned010 vned025)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	35	71,4%	11	78,6%	46	73,0%
4-6 jours par semaine	7	14,3%	3	21,4%	10	15,9%
2-3 jours par semaine	2	4,1%	0	0,0%	2	3,2%
1 jour par semaine ou moins	3	6,1%	0	0,0%	3	4,8%
aucune consommation	2	4,1%	0	0,0%	2	3,2%
Total	49	100,0%	14	100,0%	63	100,0%
Missing	5		0		5	

Mode d'administration
C12 Mode d'administration, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vned030)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
injection	31	36,0%	7	31,8%	38	35,2%
fumée, inhalation	41	47,7%	7	31,8%	48	44,4%
ingestion (manger/boire)	0	0,0%	3	13,6%	3	2,8%
sniff	14	16,3%	5	22,7%	19	17,6%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	86	100,0%	22	100,0%	108	100,0%
Missing	2		2		4	

C13 Mode d'administration, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vned030)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
injection	29	26,9%	14	43,8%	43	30,7%
fumée, inhalation	29	26,9%	10	31,3%	39	27,9%
ingestion (manger/boire)	0	0,0%	1	3,1%	1	0,7%
sniff	50	46,3%	7	21,9%	57	40,7%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	108	100,0%	32	100,0%	140	100,0%
Missing	5		2		7	

Âge première consommation, consommation régulière et consommation problématique

C14 Statistique: Âge première consommation de la principale substance posant problème (vmed040)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	17,94	17,00	3,00	45,00	5,39	330	374
femmes	18,37	16,50	9,00	40,00	5,76	100	120
Total	18,04	17,00	3,00	45,00	5,48	430	494

C15 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vmed010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	29	45,3%	11	57,9%	40	48,2%
15-17 ans	27	42,2%	5	26,3%	32	38,6%
18-20 ans	4	6,3%	0	0,0%	4	4,8%
plus de 20 ans	4	6,3%	3	15,8%	7	8,4%
Total	64	100,0%	19	100,0%	83	100,0%
Missing	11		5		16	

C16 Statistique: Âge première consommation, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	15,02	15,00	3,00	45,00	5,24	64	75
femmes	16,79	14,00	9,00	40,00	7,81	19	24
Total	15,42	15,00	3,00	45,00	5,92	83	99

C17 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	4	4,8%	2	10,5%	6	5,9%
15-17 ans	31	37,3%	8	42,1%	39	38,2%
18-20 ans	22	26,5%	4	21,1%	26	25,5%
plus de 20 ans	26	31,3%	5	26,3%	31	30,4%
Total	83	100,0%	19	100,0%	102	100,0%
Missing	5		5		10	

C18 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	19,55	18,00	13,00	39,00	4,57	83	88
femmes	18,16	17,00	12,00	26,00	3,89	19	24
Total	19,29	18,00	12,00	39,00	4,46	102	112

C19 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	11	10,9%	4	13,8%	15	11,5%
15-17 ans	28	27,7%	9	31,0%	37	28,5%
18-20 ans	32	31,7%	8	27,6%	40	30,8%
plus de 20 ans	30	29,7%	8	27,6%	38	29,2%
Total	101	100,0%	29	100,0%	130	100,0%
Missing	12		5		17	

C20 Âge première consommation, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	20,13	18,00	12,00	41,00	5,84	101	113
femmes	18,90	18,00	13,00	34,00	4,47	29	34
Total	19,85	18,00	12,00	41,00	5,57	130	147

C21 Âge début consommation régulière problème principal ALCOOL (vned010 vmed050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	7	11,1%	1	5,0%	8	9,6%
15-17 ans	20	31,7%	8	40,0%	28	33,7%
18-20 ans	18	28,6%	2	10,0%	20	24,1%
plus de 20 ans	18	28,6%	9	45,0%	27	32,5%
Total	63	100,0%	20	100,0%	83	100,0%
Missing	12		4		16	

C22 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010 vmed050)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	20,37	18,00	12,00	45,00	6,90	63	75
femmes	22,10	20,00	12,00	44,00	8,42	20	24
Total	20,78	18,00	12,00	45,00	7,28	83	99

C23 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	1	1,2%	0	0,0%	1	1,0%
15-17 ans	11	13,3%	6	30,0%	17	16,5%
18-20 ans	29	34,9%	5	25,0%	34	33,0%
plus de 20 ans	42	50,6%	9	45,0%	51	49,5%
Total	83	100,0%	20	100,0%	103	100,0%
Missing	5		4		9	

C24 Statistiek: Âge début consommation régulière problème principal OPIOÏDES, sans prescription(vned010 vmed050)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	21,71	21,00	13,00	40,00	5,23	83	88
femmes	20,70	19,00	15,00	38,00	5,24	20	24
Total	21,51	20,00	13,00	40,00	5,22	103	112

C25 Âge début consommation régulière, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed050)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	5	5,0%	2	7,1%	7	5,4%
15-17 ans	16	15,8%	4	14,3%	20	15,5%
18-20 ans	27	26,7%	7	25,0%	34	26,4%
plus de 20 ans	53	52,5%	15	53,6%	68	52,7%
Total	101	100,0%	28	100,0%	129	100,0%
Missing	12		6		18	

C26 Âge début consommation régulière, problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed050)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	22,64	21,00	13,00	43,00	6,72	101	113
femmes	21,50	21,00	14,00	34,00	4,86	28	34
Total	22,40	21,00	13,00	43,00	6,36	129	147

C27 Âge consommation problématique problème principal ALCOOL (vned010 vmed060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	1	1,6%	1	5,6%	2	2,5%
15-17 ans	10	15,9%	1	5,6%	11	13,6%
18-20 ans	18	28,6%	4	22,2%	22	27,2%
plus de 20 ans	34	54,0%	12	66,7%	46	56,8%
Total	63	100,0%	18	100,0%	81	100,0%
Missing	12		6		18	

C28 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal ALCOOL (vned010 vmed060)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	24,81	21,00	13,00	63,00	9,55	63	75
femmes	27,06	24,00	14,00	48,00	10,50	18	24
Total	25,31	22,00	13,00	63,00	9,75	81	99

C29 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	1	1,2%	0	0,0%	1	1,0%
15-17 ans	7	8,4%	2	11,1%	9	8,9%
18-20 ans	24	28,9%	8	44,4%	32	31,7%
plus de 20 ans	51	61,4%	8	44,4%	59	58,4%
Total	83	100,0%	18	100,0%	101	100,0%
Missing	5		6		11	

C30 Âge début consommation régulière, sous-groupe: OPIOÏDES, sans prescription (vned010 vmed060)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	23,29	22,00	14,00	43,00	5,92	83	88
femmes	22,00	20,00	15,00	38,00	5,65	18	24
Total	23,06	22,00	14,00	43,00	5,86	101	112

C31 Âge consommation problématique, sous-groupe: problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
moins de 15 ans	2	2,0%	1	3,7%	3	2,4%
15-17 ans	7	7,1%	4	14,8%	11	8,8%
18-20 ans	27	27,6%	6	22,2%	33	26,4%
plus de 20 ans	62	63,3%	16	59,3%	78	62,4%
Total	98	100,0%	27	100,0%	125	100,0%
Missing	15		7		22	

C32 Âge consommation problématique problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vned010 vmed060)

TOTAL act-info-FOS

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	24,61	23,00	13,00	45,00	6,74	98	113
femmes	22,15	21,00	14,00	34,00	4,97	27	34
Total	24,08	23,00	13,00	45,00	6,46	125	147

Autres troubles addictifs selon sous-groupe problème principal

.....

Concernant les tableaux ci-après, plusieurs réponses sont possibles.

C33 48% des personnes du groupe **Alcool** mentionnent la cocaïne comme autre substance posant problème. 40% citent le cannabis, 37% l'héroïne et 19% les benzodiazépines. Pour 46% le tabac pose problème.

C34 Les personnes du groupe **Opiïodes** mentionnent les substances problématiques suivantes: la cocaïne pour 62%, l'alcool pour 39%, le cannabis pour 38% et les benzodiazépines pour 28%. Le tabac pose problème pour 58%.

C35 Parmi le groupe **Cocaïne**, 45% de la clientèle mentionnent l'alcool comme autre substance problématique; 41% citent l'héroïne, 37% le cannabis et 18% les benzodiazépines. Pour 60% le tabac est une substance problématique.

C36 49% des personnes du groupe **Cannabis** citent l'alcool comme autre substance problématique, 31% mentionnent la cocaïne, 28% les amphétamines, 26% MDMA et substances similaires et 24% LSD. Le tabac pose problème pour 65%.

C33 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses) (vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
héroïne	réponses	20	5	25
	personnes %	40,8%	27,8%	37,3%
méthadone (sans prescription)	réponses	6	0	6
	personnes %	12,2%	0,0%	9,0%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes	réponses	1	0	1
	personnes %	2,0%	0,0%	1,5%
cocaïne	réponses	23	9	32
	personnes %	46,9%	50,0%	47,8%
crack	réponses	3	0	3
	personnes %	6,1%	0,0%	4,5%
autres formes de cocaïne	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
amphétamines	réponses	5	4	9
	personnes %	10,2%	22,2%	13,4%
métamphétamines (crystal meth etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	2,0%	0,0%	1,5%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	3	2	5
	personnes %	6,1%	11,1%	7,5%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres stimulants	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	7	6	13
	personnes %	14,3%	33,3%	19,4%
GHB/GBL	réponses	1	1	2
	personnes %	2,0%	5,6%	3,0%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	1	2	3
	personnes %	2,0%	11,1%	4,5%
LSD	réponses	1	1	2
	personnes %	2,0%	5,6%	3,0%
kétamine	réponses	2	1	3
	personnes %	4,1%	5,6%	4,5%
autres hallucinogènes	réponses	2	0	2
	personnes %	4,1%	0,0%	3,0%
substances volatiles	réponses	1	0	1
	personnes %	2,0%	0,0%	1,5%
cannabis	réponses	21	6	27
	personnes %	42,9%	33,3%	40,3%
tabac	réponses	25	6	31
	personnes %			

C33 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal ALCOOL (plusieurs réponses) (vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
tabac	personnes %	51,0%	33,3%	46,3%
	réponses	0	0	0
	autres substances (tous types)	0,0%	0,0%	0,0%
	réponses	4	2	6
	personnes %	8,2%	11,1%	9,0%
Total	réponses	127	45	172
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	49	18	67
	personnes %	259,2%	250,0%	256,7%
Missing		26	6	32

C34 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal OPIOÏDES, sans prescription (plusieurs réponses) (vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
alcool	réponses	29	11	40
	personnes %	35,8%	47,8%	38,5%
cocaïne	réponses	50	14	64
	personnes %	61,7%	60,9%	61,5%
crack	réponses	7	2	9
	personnes %	8,6%	8,7%	8,7%
autres formes de cocaïne	réponses	2	1	3
	personnes %	2,5%	4,3%	2,9%
amphétamines	réponses	10	0	10
	personnes %	12,3%	0,0%	9,6%
métamphétamines (crystal meth etc.)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,2%	0,0%	1,0%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	9	0	9
	personnes %	11,1%	0,0%	8,7%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédrone, méthédrone)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,2%	0,0%	1,0%
autres stimulants	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	4,3%	1,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	1	1	2
	personnes %	1,2%	4,3%	1,9%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	23	6	29
	personnes %	28,4%	26,1%	27,9%
GHB/GBL	réponses	2	0	2
	personnes %	2,5%	0,0%	1,9%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	4,3%	1,0%
LSD	réponses	9	0	9
	personnes %	11,1%	0,0%	8,7%
kétamine	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%

C34 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal OPIOÏDES, sans prescription (plusieurs réponses) (vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS		
		hommes	femmes			
	autres hallucinogènes	réponses	0	0	0	
		personnes %	0,0%	0,0%	0,0%	
	substances volatiles	réponses	0	0	0	
		personnes %	0,0%	0,0%	0,0%	
	cannabis	réponses	34	5	39	
		personnes %	42,0%	21,7%	37,5%	
	tabac	réponses	49	11	60	
		personnes %	60,5%	47,8%	57,7%	
	autres substances (tous types)	réponses	1	0	1	
		personnes %	1,2%	0,0%	1,0%	
	troubles comparables à une addiction	réponses	1	0	1	
		personnes %	1,2%	0,0%	1,0%	
	Total	réponses		229	53	282
		réponses %		100,0%	100,0%	100,0%
		nombre de personnes		81	23	104
		personnes %		282,7%	230,4%	271,2%
Missing		7	1	8		

C35 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses; vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	2	2
	personnes %	0,0%	6,9%	1,6%
alcool	réponses	44	13	57
	personnes %	45,4%	44,8%	45,2%
héroïne	réponses	41	11	52
	personnes %	42,3%	37,9%	41,3%
méthadone (sans prescription)	réponses	8	3	11
	personnes %	8,2%	10,3%	8,7%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	1,0%	0,0%	0,8%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes	réponses	3	1	4
	personnes %	3,1%	3,4%	3,2%
amphétamines	réponses	15	2	17
	personnes %	15,5%	6,9%	13,5%
métamphétamines (crystal meth etc.)	réponses	8	1	9
	personnes %	8,2%	3,4%	7,1%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	13	4	17
	personnes %	13,4%	13,8%	13,5%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédrone)	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	3,4%	0,8%
autres stimulants	réponses	1	0	1
	personnes %	1,0%	0,0%	0,8%
barbituriques (sans prescription)	réponses	3	0	3
	personnes %	3,1%	0,0%	2,4%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	14	9	23
	personnes %	14,4%	31,0%	18,3%
GHB/GBL	réponses	4	1	5
	personnes %	4,1%	3,4%	4,0%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	2	1	3
	personnes %	2,1%	3,4%	2,4%
LSD	réponses	9	1	10
	personnes %	9,3%	3,4%	7,9%
kétamine	réponses	0	1	1
	personnes %	0,0%	3,4%	0,8%
autres hallucinogènes	réponses	4	0	4
	personnes %	4,1%	0,0%	3,2%
substances volatiles	réponses	1	0	1
	personnes %	1,0%	0,0%	0,8%
cannabis	réponses	40	7	47
	personnes %	41,2%	24,1%	37,3%
tabac	réponses	60	16	76
	personnes %	61,9%	55,2%	60,3%
autres substances (tous types)	réponses	3	1	4
	personnes %	3,1%	3,4%	3,2%
troubles comparables à une	réponses	5	2	7

C35 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (plusieurs réponses; vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
	addiction personnes %	5,2%	6,9%	5,6%
Total	réponses	279	77	356
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	97	29	126
	personnes %	287,6%	265,5%	282,5%
Missing		16	5	21

C36 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal CANNABIS (plusieurs réponses; vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act-info-FOS
		hommes	femmes	
aucune substance n'est un problème	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
alcool	réponses	22	3	25
	personnes %	53,7%	30,0%	49,0%
héroïne	réponses	4	2	6
	personnes %	9,8%	20,0%	11,8%
méthadone (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	2,4%	0,0%	2,0%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
fentanyl (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres opioïdes	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
cocaïne	réponses	12	4	16
	personnes %	29,3%	40,0%	31,4%
crack	réponses	1	1	2
	personnes %	2,4%	10,0%	3,9%
autres formes de cocaïne	réponses	1	0	1
	personnes %	2,4%	0,0%	2,0%
amphétamines	réponses	10	4	14
	personnes %	24,4%	40,0%	27,5%
métamphétamines (crystal meth etc.)	réponses	2	2	4
	personnes %	4,9%	20,0%	7,8%
MDMA et substances similaires (Ecstasy)	réponses	10	3	13
	personnes %	24,4%	30,0%	25,5%
cathinones de synthèse (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
autres stimulants	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
barbituriques (sans prescription)	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	2	0	2
	personnes %	4,9%	0,0%	3,9%
GHB/GBL	réponses	0	0	0
	personnes %	0,0%	0,0%	0,0%

C36 Autres troubles addictifs: sous-groupe problème principal CANNABIS (plusieurs réponses; vned070y-kd)

		Sexe		TOTAL act- info-FOS
		hommes	femmes	
	autres somnifères, tranquillisants	réponses	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%
	LSD	réponses	10	12
		personnes %	24,4%	23,5%
	kétamine	réponses	1	2
		personnes %	2,4%	3,9%
	autres hallucinogènes	réponses	1	1
		personnes %	2,4%	2,0%
	substances volatiles	réponses	2	2
		personnes %	4,9%	3,9%
	tabac	réponses	25	33
		personnes %	61,0%	64,7%
	autres substances (tous types)	réponses	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%
	troubles comparables à une addiction	réponses	2	3
		personnes %	4,9%	5,9%
Total	réponses	106	31	137
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	41	10	51
	personnes %	258,5%	310,0%	268,6%
Missing		13	4	17

Objectif de consommation

.....

C37 Au début du traitement, 80% de la clientèle vise l'abstinence complète. 93% de la clientèle (principale substance: opioïdes; **C39**) et 90% de la clientèle (principale substance: cocaïne; **C40**) vise l'abstinence complète.

C37 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance posant problème? (vzeo010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	278	80,3%	88	79,3%	366	80,1%
abstinence limitée dans le temps	23	6,6%	5	4,5%	28	6,1%
consommation contrôlée	33	9,5%	12	10,8%	45	9,8%
aucune limitation envisagée	1	0,3%	1	0,9%	2	0,4%
pas déterminé pour l'instant	7	2,0%	3	2,7%	10	2,2%
autre	4	1,2%	2	1,8%	6	1,3%
Total	346	100,0%	111	100,0%	457	100,0%
Missing	28		9		37	

C38 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal ALCOOL (vzeo010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	47	67,1%	16	76,2%	63	69,2%
abstinence limitée dans le temps	6	8,6%	2	9,5%	8	8,8%
consommation contrôlée	12	17,1%	3	14,3%	15	16,5%
aucune limitation envisagée	1	1,4%	0	0,0%	1	1,1%
pas déterminé pour l'instant	4	5,7%	0	0,0%	4	4,4%
autre	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Total	70	100,0%	21	100,0%	91	100,0%
Missing	5		3		8	

C39 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal OPIOÏDES (vzeo010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	77	92,8%	20	95,2%	97	93,3%
abstinence limitée dans le temps	2	2,4%	0	0,0%	2	1,9%
consommation contrôlée	2	2,4%	1	4,8%	3	2,9%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
pas déterminé pour l'instant	1	1,2%	0	0,0%	1	1,0%
autre	1	1,2%	0	0,0%	1	1,0%
Total	83	100,0%	21	100,0%	104	100,0%
Missing	5		3		8	

C40 Objectif de consommation: sous-groupe problème principal COCAÏNE (ci-inclus crack, freebase) (vzeo010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	100	89,3%	30	90,9%	130	89,7%
abstinence limitée dans le temps	3	2,7%	0	0,0%	3	2,1%
consommation contrôlée	6	5,4%	2	6,1%	8	5,5%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
pas déterminé pour l'instant	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
autre	3	2,7%	1	3,0%	4	2,8%
Total	112	100,0%	33	100,0%	145	100,0%
Missing	1		1		2	

Injection

.....

C41 41% des clients et clientes se sont déjà au moins une fois injecté des drogues. Parmi les personnes qui ont déjà consommé des drogues par injection, 69% l'ont fait au cours des 12 mois précédant le début de la thérapie (tab. **C42**). Parmi les personnes qui ont consommé des drogues par injection au cours des 12 mois précédant le traitement, 47% l'ont également fait dans les 30 jours avant le début du traitement (tab. **C43**). L'âge moyen de la première injection est de 22 ans (tab. **C44**).

C41 Déjà consommé une drogue illégale par injection? (vned090)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	134	39,6%	50	46,3%	184	41,3%
jamais	204	60,4%	58	53,7%	262	58,7%
Total	338	100,0%	108	100,0%	446	100,0%
Missing_	36		12		48	

C42 Déjà consommé une drogue illégale par injection (derniers 12 mois)? sous-groupe: déjà injecté (vned093)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	86	67,7%	35	71,4%	121	68,8%
non, pas dans les 12 derniers mois	41	32,3%	14	28,6%	55	31,3%
Total	127	100,0%	49	100,0%	176	100,0%
Missing	7		1		8	

C43 Déjà consommé une drogue illégale par injection (derniers 30 jours)? sous-groupe: déjà injecté dans les 12 derniers mois (vned095)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	38	45,8%	15	48,4%	53	46,5%
dans les 12 derniers mois mais pas dans les 30 derniers jours	45	54,2%	16	51,6%	61	53,5%
Total	83	100,0%	31	100,0%	114	100,0%
Missing	3		4		7	

C44a Âge première injection (vmed096)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
jusqu` à 15 ans	3	3,8%	1	3,3%	4	3,7%
15-17 ans	13	16,7%	5	16,7%	18	16,7%
18-20 ans	19	24,4%	8	26,7%	27	25,0%
20 ans et plus	43	55,1%	16	53,3%	59	54,6%
Total	78	100,0%	30	100,0%	108	100,0%
Missing	8		5		13	

C44b Statistique: Âge première injection (vmed096)

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviati on standard	Valid Cases	TOTAL Cases
hommes	22,61	21,00	13,00	43,00	6,06	134	118
femmes	21,11	20,00	13,00	35,00	5,33	49	44
Total	22,20	21,00	13,00	43,00	5,89	183	162

C45 Parmi les personnes qui ont déjà consommé par injection, 38% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices. Parmi les personnes qui ont consommé par injection au cours des 12 derniers mois, 17% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices (2015: 30%) – il n'y a pas de différence significative entre les sexes (tab. **C46**). Parmi les personnes qui ont consommé par injection au cours des 30 derniers jours, 20% ont indiqué avoir employé des seringues ou aiguilles d'autres consommateurs ou consommatrices (petit nombre) (tab. **C47**).

C45 Déjà injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne? (vned092)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	40	34,8%	19	48,7%	59	38,3%
non	75	65,2%	20	51,3%	95	61,7%
Total	115	100,0%	39	100,0%	154	100,0%
Missing_	19		11		30	

C46 Injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne dans les 12 derniers mois (vned094)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	6	15,4%	4	21,1%	10	17,2%
non, pas dans les 12 derniers mois	33	84,6%	15	78,9%	48	82,8%
Total	39	100,0%	19	100,0%	58	100,0%
Missing	1		0		1	

C47 Injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne dans les 30 derniers jours (vned098)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	1	16,7%	1	25,0%	2	20,0%
dans les 12 derniers mois, mais pas dans les 30 derniers jours	5	83,3%	3	75,0%	8	80,0%
Total	6	100,0%	4	100,0%	10	100,0%
Missing	0		0		0	

D SANTÉ

VIH

D1 87% des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage du VIH. Parmi les personnes qui ont effectué un test VIH, 70% l'ont effectué au cours des 12 mois précédents (tab. **D2**). Le résultat était positif pour 3% des personnes (tab. **D3**).

D1 Test VIH effectué (vyek040)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	282	85,5%	101	91,0%	383	86,8%
non	48	14,5%	10	9,0%	58	13,2%
Total	330	100,0%	111	100,0%	441	100,0%
Missing_	44		9		53	

D2 Test VIH effectué dans les 12 derniers mois (vyek041)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	181	68,0%	66	74,2%	247	69,6%
non, pas dans les 12 derniers mois	85	32,0%	23	25,8%	108	30,4%
Total	266	100,0%	89	100,0%	355	100,0%
Missing_	16		12		28	

D3 Résultat test VIH, sous-groupe: test effectué (vyek042)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
test VIH positif pour la première fois avant les 12 derniers mois	4	1,5%	5	5,3%	9	2,5%
test VIH positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois	1	0,4%	0	0,0%	1	0,3%
test VIH négatif	268	98,2%	89	94,7%	357	97,3%
Total	273	100,0%	94	100,0%	367	100,0%
Missing	9		7		16	

Hépatite C

.....

D4 82% des clients et clientes se sont déjà soumis à un test de dépistage de l'hépatite C. Parmi les personnes qui ont effectué un test, 70% l'ont effectué au cours des 12 mois précédents (tab. **D5**). Le résultat était positif pour 22% d'entre elles (tab. **D6**).

D4 Test hépatite C effectué (vyek060)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	256	81,5%	85	81,7%	341	81,6%
non	58	18,5%	19	18,3%	77	18,4%
Total	314	100,0%	104	100,0%	418	100,0%
Missing_	60		16		76	

D5 Test hépatite C effectué dans les 12 derniers mois (vyek061)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
oui	170	70,2%	53	70,7%	223	70,3%
non, pas dans les 12 derniers mois, mais avant	72	29,8%	22	29,3%	94	29,7%
Total	242	100,0%	75	100,0%	317	100,0%
Missing_	14		10		24	

D6 Résultat test hépatite C, sous-groupe: test effectué (vyek062)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
test hépatite C positif pour la première fois avant les 12 derniers mois	35	14,5%	16	20,8%	51	16,0%
test hépatite C positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois	13	5,4%	6	7,8%	19	6,0%
test hépatite C négatif	194	80,2%	55	71,4%	249	78,1%
Total	242	100,0%	77	100,0%	319	100,0%
Missing	14		8		22	

TABLEAUX des SORTIES 2016

0.1 L'évaluation se base sur **465** questionnaires valablement remplis.

0.1 Source des informations (vmad040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
informations fournies par le client/la cliente	67	18,9%	26	25,5%	93	20,4%
informations fournies par l'intervenant-e	287	81,1%	76	74,5%	363	79,6%
Total	354	100,0%	102	100,0%	456	100,0%
Missing	5		4		9	

0.2 La proportion de femmes est de 23%.

0.2 Sexe (vmec010)

	n	%
hommes	359	77,2%
femmes	106	22,8%
Total	465	100,0%
Missing	0	

0.3 Âge, catégorisé selon les conventions act-info (vmec020)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
15-19 ans	22	6,1%	6	5,7%	28	6,0%
20-24 ans	39	10,9%	14	13,2%	53	11,4%
25-29 ans	66	18,4%	20	18,9%	86	18,5%
30-34 ans	61	17,0%	22	20,8%	83	17,8%
35-39 ans	65	18,1%	20	18,9%	85	18,3%
40-44 ans	57	15,9%	13	12,3%	70	15,1%
45-49 ans	34	9,5%	6	5,7%	40	8,6%
50-54 ans	12	3,3%	4	3,8%	16	3,4%
55-59 ans	2	0,6%	1	0,9%	3	0,6%
60-64 ans	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Total	359	100,0%	106	100,0%	465	100,0%
Missing	0		0		0	

0.4 Âge, catégorisé selon les conventions act-info-FOS (vmec020)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
jusqu'à 19 ans	22	6,1%	6	5,7%	28	6,0%
20-24 ans	39	10,9%	14	13,2%	53	11,4%
25-29 ans	66	18,4%	20	18,9%	86	18,5%
30-39 ans	126	35,1%	42	39,6%	168	36,1%
40 ans et plus	106	29,5%	24	22,6%	130	28,0%
Total	359	100,0%	106	100,0%	465	100,0%
Missing	0		0		0	

0.5b Statistique: Âge, moyenne (vmec020)

	Moyenne	Médiane	min	max	Déviaton standard	Valid Cases
hommes	33,99	34,00	16,00	60,00	9,28	359
femmes	32,78	33,00	17,00	57,00	8,86	106
Total	33,71	33,00	16,00	60,00	9,19	465

0.6 Nombre de client-e-s selon le domicile canton (vmac010c)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
AG	17	5,0%	6	5,8%	23	5,2%
AR	1	0,3%	2	1,9%	3	0,7%
BE	63	18,6%	18	17,5%	81	18,3%
BL	15	4,4%	4	3,9%	19	4,3%
BS	14	4,1%	5	4,9%	19	4,3%
FR	16	4,7%	2	1,9%	18	4,1%
GE	12	3,5%	1	1,0%	13	2,9%
GR	1	0,3%	1	1,0%	2	0,5%
JU	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
LU	23	6,8%	10	9,7%	33	7,5%
NE	3	0,9%	0	0,0%	3	0,7%
NW	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
OW	1	0,3%	2	1,9%	3	0,7%
SG	18	5,3%	1	1,0%	19	4,3%
SO	14	4,1%	7	6,8%	21	4,8%
SZ	5	1,5%	0	0,0%	5	1,1%
TG	3	0,9%	1	1,0%	4	0,9%
TI	22	6,5%	5	4,9%	27	6,1%
UR	2	0,6%	0	0,0%	2	0,5%
VD	43	12,7%	15	14,6%	58	13,1%
VS	11	3,2%	1	1,0%	12	2,7%
ZG	6	1,8%	1	1,0%	7	1,6%
ZH	47	13,9%	21	20,4%	68	15,4%
Total	339	100,0%	103	100,0%	442	100,0%
Missing	20		3		23	

A CADRE DE LA PRISE EN CHARGE

A1 36% de la clientèle a achevé le traitement selon les termes convenus sans passer à un autre suivi, 19% l'a achevé comme prévu pour passer dans un établissement de traitement des addictions – au total, 55% ont achevé le traitement comme convenu (2015: 43%). Pour 33% des personnes, le traitement a été interrompu soit par le client soit par l'institution traitante (perte de contact comprise; 2015: 48%). On n'observe pas de différence significative entre les hommes et les femmes sur la question du genre de sortie. Aucun décès n'a été enregistré.

A1 Raison principale de la fin du traitement (vmab040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
fin régulière du traitement sans transfert vers une institution spécialisé-e en matière de dépendances	123	35,0%	42	40,4%	165	36,3%
fin régulière du traitement avec transfert vers une institution spécialisé-e en matière de dépendances	63	17,9%	24	23,1%	87	19,1%
changement de domicile	4	1,1%	1	1,0%	5	1,1%
hospitalisation	7	2,0%	1	1,0%	8	1,8%
détention	22	6,3%	3	2,9%	25	5,5%
perte de contact	2	0,6%	3	2,9%	5	1,1%
rupture explicite du traitement de la part du client/de la cliente ou de l'institution	119	33,9%	27	26,0%	146	32,1%
autre raison pour la fin du traitement	11	3,1%	3	2,9%	14	3,1%
Total	351	100,0%	104	100,0%	455	100,0%
Missing	8		2		10	

A2 Parmi les personnes qui ont achevé le traitement comme prévu pour passer à un autre suivi, 43% vont en appartement protégé et 21% suivent un traitement résidentiel. 23% suivent un traitement en structure/ clinique de jour.

A2 Transfert vers une institution spécialisée en matière de dépendance, sous-groupe: fin régulière avec transfert (vnab041) sans missing

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
traitement résidentiel	12	19,7%	6	26,1%	18	21,4%
prise en charge dans une structure de jour/clinique de jour	13	21,3%	6	26,1%	19	22,6%
prise en charge ambulatoire	27	44,3%	9	39,1%	36	42,9%
autre institution	9	14,8%	2	8,7%	11	13,1%
Total	61	100,0%	23	100,0%	84	100,0%
Missing	2		1		3	

A4a-c Les tableaux montrent la ventilation des deux groupes de clientèle «fin de traitement comme prévu» et «interruption de traitement» selon la substance principale qui posait problème au moment de l'ADMISSION d'abord pour le groupe complet, puis en fonction du sexe.

A4a Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: TOTAL (vmab040, vmed010), sans missing

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	50	20,2%	16	11,5%	8	14,3%	74	16,7%
opioïdes (sans prescription)	69	27,9%	44	31,7%	11	19,6%	124	28,1%
cocaïne, crack, autre	65	26,3%	48	34,5%	24	42,9%	137	31,0%
stimulants	10	4,0%	6	4,3%	2	3,6%	18	4,1%
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	8	3,2%	5	3,6%	4	7,1%	17	3,8%
hallucinogènes	2	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
cannabis	36	14,6%	19	13,7%	7	12,5%	62	14,0%
tabac	7	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	7	1,6%
autres substances	0	0,0%	1	0,7%	0	0,0%	1	0,2%
Total	247	100,0%	139	100,0%	56	100,0%	442	100,0%

A4b Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: HOMMES (vmab040, vmed010, vmec010), sans missing

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	35	19,1%	15	13,4%	7	14,9%	57	16,7%
opioïdes (sans prescription)	52	28,4%	36	32,1%	8	17,0%	96	28,1%
cocaïne, crack, autre	44	24,0%	36	32,1%	21	44,7%	101	29,5%
stimulants	9	4,9%	4	3,6%	1	2,1%	14	4,1%
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	6	3,3%	4	3,6%	4	8,5%	14	4,1%
hallucinogènes	2	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,6%
cannabis	31	16,9%	16	14,3%	6	12,8%	53	15,5%
tabac	4	2,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,2%
autres substances	0	0,0%	1	0,9%	0	0,0%	1	0,3%
Total	183	100,0%	112	100,0%	47	100,0%	342	100,0%

A4c Principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION et circonstances: FEMMES (vmab040, vmed010, vmec010), sans missing

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
alcool	15	23,4%	1	3,7%	1	11,1%	17	17,0%
opioïdes (sans prescription)	17	26,6%	8	29,6%	3	33,3%	28	28,0%
cocaïne, crack, autre	21	32,8%	12	44,4%	3	33,3%	36	36,0%
stimulants	1	1,6%	2	7,4%	1	11,1%	4	4,0%
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	2	3,1%	1	3,7%	0	0,0%	3	3,0%
cannabis	5	7,8%	3	11,1%	1	11,1%	9	9,0%
tabac	3	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,0%
Total	64	100,0%	27	100,0%	9	100,0%	100	100,0%

Durée du séjour

.....

A5 6% des clients et clientes sont restés un mois ou moins en traitement, 13% entre 1 et 3 mois. Parmi les résidents de longue durée, 16% auront passé entre 12 et 18 mois en traitement résidentiel et 23% plus de 18 mois

A5 Durée du séjour (vmeb040a, vmab020)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	22	6,1%	6	5,7%	28	6,0%
1 à 3 mois (31-90 jours)	46	12,8%	16	15,1%	62	13,3%
3 à 6 mois (91-180 jours)	65	18,1%	23	21,7%	88	18,9%
6 à 9 mois (181-270 jours)	44	12,3%	14	13,2%	58	12,5%
9 à 12 mois (271-360 jours)	40	11,1%	5	4,7%	45	9,7%
12 à 18 mois (361-540 jours)	59	16,4%	16	15,1%	75	16,1%
18 mois et plus (plus de 540 jours)	83	23,1%	26	24,5%	109	23,4%
Total	359	100,0%	106	100,0%	465	100,0%
Missing	0		0		0	

A6 La durée moyenne du traitement est de 385 jours. Les hommes (367 jours) sont moins longtemps en traitement que les femmes (446 jours). Toutefois, en raison de l'écart standard élevé, cette différence n'est pas significative.

A6 Statistik: Statistique: Durée du séjour (en jour)

	Moyenne	Médiane	Déviations standard	Valid Cases
hommes	366,92	272,00	345,72	359
femmes	445,75	232,50	705,57	106
Total	384,89	258,00	453,84	465

A7 La durée moyenne du séjour calculée sans tenir compte des personnes au séjour particulièrement long (plus de 2 ans) est de 255 jours. Les hommes restent en moyenne 258 jours en traitement et les femmes 244 jours (pas de différence).

A7 Statistique: Durée du séjour (en jour): sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans

	Moyenne	Médiane	Déviations standard	Valid Cases
hommes	258,31	221,50	185,28	310
femmes	244,34	180,00	197,14	90
Total	255,17	211,50	187,85	400

A8 De façon prévisible, les personnes qui achèvent le traitement selon les termes convenus (qu'elles passent ou non à un autre suivi) se distinguent très significativement de celles qui interrompent le traitement: ces dernières sont significativement plus nombreuses à passer jusqu'à 1 mois ou entre 1 et 3 mois en traitement, alors que celles qui achèvent le traitement comme convenu passent plus souvent plus de 18 mois dans l'institution (Cr's $V=.31$; $p<.000$).

A8 Durée de séjour et circonstances de sortie sans autre raisons (vmab040, vmab040a, vmab020)

	fin régulière avec ou sans transfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 1 mois (0-30 jours)	4	1,6%	18	12,5%	4	6,8%	26	5,7%
1 à 3 mois (31-90 jours)	18	7,1%	32	22,2%	11	18,6%	61	13,4%
3 à 6 mois (91-180 jours)	37	14,7%	34	23,6%	14	23,7%	85	18,7%
6 à 9 mois (181-270 jours)	26	10,3%	24	16,7%	7	11,9%	57	12,5%
9 à 12 mois (271-360 jours)	30	11,9%	9	6,3%	5	8,5%	44	9,7%
12 à 18 mois (361-540 jours)	46	18,3%	15	10,4%	12	20,3%	73	16,0%
18 mois et plus (plus de 540 jours)	91	36,1%	12	8,3%	6	10,2%	109	24,0%
Total	252	100,0%	144	100,0%	59	100,0%	455	100,0%

A9a-c Les clients dont le traitement se termine comme convenu restent en traitement 509 jours en moyenne, contre 227 jours en moyenne en cas d'interruption ($p<.000$). Ces différences valent aussi à l'intérieur du groupe formé par les hommes, mais pas pour le groupe des femmes (à nouveau en raison de l'écart standard élevé). Si l'on exclut les femmes dont le séjour est inhabituellement long, la différence est là aussi significative pour les femmes (pas de tableau).

A9a Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie

	Moyenne	Médiane	Déviations standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans transfert	509,16	369,00	507,87	252
rupture ou perte de contact	227,43	144,00	358,56	144
autre	272,00	184,00	247,59	59
Total	389,24	261,00	457,16	455

A9b Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie: HOMMES

	Moyenne	Médiane	Déviations standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans transfert	499,92	370,50	390,25	186
rupture ou perte de contact	208,81	155,50	198,67	116
autre	264,88	144,00	244,05	49
Total	370,90	277,00	347,51	351

A9c Durée du séjour (en jours) et circonstances de sortie: FEMMES

	Moyenne	Médiane	Déviations standard	Valid Cases
fin régulière avec ou sans transfert	535,20	346,00	749,41	66
rupture ou perte de contact	304,57	136,50	710,73	28
autre	306,90	220,50	275,27	10
Total	451,15	232,50	711,22	104

A10a Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans

	Moyenne	Médiane	Déviati standard	Valid Cases
alcool	265,36	235,00	195,67	67
opioïdes (sans prescription)	267,13	227,00	188,64	102
cocaïne, crack, autre	248,61	186,00	197,58	125
stimulants	300,00	337,50	178,29	16
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	237,60	139,00	198,68	15
hallucinogènes	178,00	178,00	.	1
cannabis	228,69	190,00	161,98	55
tabac	331,00	360,00	98,92	4
autre substances	93,00	93,00	.	1
troubles comparables à une addiction	.	.	.	
TOTAL	255,54	208,00	187,91	386

A10b Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans: HOMMES

	Moyenne	Médiane	Déviati standard	Valid Cases
alcool	264,51	235,00	199,99	51
opioïdes (sans prescription)	256,21	227,00	172,59	81
cocaïne, crack, autre	259,20	186,00	202,23	93
stimulants	354,00	348,00	151,01	13
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	267,67	296,00	212,69	12
hallucinogènes	178,00	178,00	.	1
cannabis	225,78	190,00	157,82	46
tabac	312,67	334,00	112,53	3
autre substances	93,00	93,00	.	1
troubles comparables à une addiction	.	.	.	
TOTAL	258,33	223,00	185,08	301

A10c Statistique: Durée du séjour (en jours) et principale substance posant problème au moment de l'ADMISSION: sans les personnes avec un séjour de plus de 2 ans: FEMMES

	Moyenne	Médiane	Déviati standard	Valid Cases
alcool	268,06	231,50	187,44	16
opioïdes (sans prescription)	309,24	224,00	241,27	21
cocaïne, crack, autre	217,81	175,00	182,92	32
stimulants	66,00	54,00	22,54	3
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	117,33	113,00	19,86	3
hallucinogènes	.	.	.	
cannabis	243,56	150,00	191,59	9
tabac	386,00	386,00	.	1
autre substances	.	.	.	
troubles comparables à une addiction	.	.	.	
TOTAL	245,66	179,00	198,43	85

Programme de substitution effectué

A11 37% des client-e-s ont suivi un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel (année précédente : 40%). Les femmes (48%) ont été significativement plus nombreuses à suivre un traitement de substitution pendant leur traitement résidentiel que les hommes (34%) (Cr's V=.12, $p<.01$).

A11 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne effectué (vmab050)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	231	66,0%	49	51,6%	280	62,9%
oui	119	34,0%	46	48,4%	165	37,1%
Total	350	100,0%	95	100,0%	445	100,0%
Missing	9		11		20	

A12 Quel programme de substitution, sous-groupe: programme de substitution effectué (vmab055)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
héroïne	2	1,7%	0	0,0%	2	1,3%
méthadone	74	64,3%	29	67,4%	103	65,2%
autres opioïdes: p. ex. la buprénorphine	37	32,2%	12	27,9%	49	31,0%
autres substances: p. ex. la naltrexone	2	1,7%	2	4,7%	4	2,5%
Total	115	100,0%	43	100,0%	158	100,0%
Missing	4		3		7	

A13 Immédiatement après la fin du traitement, un traitement de substitution (y compris prescription d'héroïne) a été prévu pour 33% de la clientèle. 92% des personnes avec un traitement de substitution après la fin du traitement suivaient déjà un tel traitement (sans tableau)

A13 Programme de substitution prévu après la fin du traitement? (vmab060)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	223	69,9%	54	59,3%	277	67,6%
oui: prescription d'héroïne	2	0,6%	0	0,0%	2	0,5%
oui: traitement de substitution (méthadone, Subutex®, etc.)	94	29,5%	37	40,7%	131	32,0%
Total	319	100,0%	91	100,0%	410	100,0%
Missing	40		15		55	

Postcure prévue ou mise en place

.....

A14. Une postcure a été prévue ou mise en place pour 54% des clients et clientes.

A14 Postcure prévue et mise en place? (vzaj010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
non	155	48,9%	34	37,0%	189	46,2%
oui	162	51,1%	58	63,0%	220	53,8%
Total	317	100,0%	92	100,0%	409	100,0%
Missing	42		14		56	

A15 Le projet de postcure consistait, pour 25% de la clientèle concernée, en un contact avec un service de postcure de l'institution, pour 19% en un contact avec un centre de conseil ambulatoire pour les problèmes liés aux drogues et pour 17% en un contact avec un service de postcure extérieur.

A15 Quel service ou groupe est-il prévu de solliciter, sous-groupe: postcure prévue et mise en place? (plusieurs réponses) (vzaj015y-vzaj015j)

			hommes	femmes	Total
appartement protégé de l'institution	réponses		24	6	30
	personnes %		15,3%	10,7%	14,1%
service de postcure de l'institution	réponses		37	17	54
	personnes %		23,6%	30,4%	25,4%
appartement protégé extérieur	réponses		20	6	26
	personnes %		12,7%	10,7%	12,2%
service de postcure extérieur	réponses		29	8	37
	personnes %		18,5%	14,3%	17,4%
centre de consultation pour problèmes liés à l'alcool	réponses		7	1	8
	personnes %		4,5%	1,8%	3,8%
centre de consultation pour problèmes liés aux drogues	réponses		35	6	41
	personnes %		22,3%	10,7%	19,2%
autre centre de consultation	réponses		9	5	14
	personnes %		5,7%	8,9%	6,6%
groupe d'entraide	réponses		6	3	9
	personnes %		3,8%	5,4%	4,2%
groupe d'anciens/anciennes client-e-s de l'institution	réponses		3	0	3
	personnes %		1,9%	0,0%	1,4%
autre: psychothérapie, psychiatre	réponses		8	0	8
	personnes %		5,1%	0,0%	3,8%
autre: traitement résidentiel de la toxicomanie	réponses		5	3	8
	personnes %		3,2%	5,4%	3,8%

A15 Quel service ou groupe est-il prévu de solliciter, sous-groupe: postcure prévue et mise en place? (plusieurs réponses) (vzaj015y-vzaj015j)

(Fort.)

(Cont.)

		hommes	femmes	Total	
	autre: clinique psychiatrique	réponses	3	1	4
		personnes %	1,9%	1,8%	1,9%
	autre: prison	réponses	2	0	2
		personnes %	1,3%	0,0%	0,9%
	autre: foyer, foyer-logement	réponses	2	4	6
		personnes %	1,3%	7,1%	2,8%
	autre: divers	réponses	7	3	10
		personnes %	4,5%	5,4%	4,7%
	Total	réponses	197	63	260
		réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
nombre de personnes		157	56	213	
personnes %		125,5%	112,5%	122,1%	
Missing		5	2	7	

B DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

B1 À leur sortie, 27% des client-e-s habitent seuls, 18% logent chez leur famille d'origine (parents ou chez l'un des deux, etc.) et 20% dans un établissement thérapeutique ou un foyer.

B1 Ménage avec qui après la sortie (vnac030)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
seul-e en ménage	87	27,7%	22	23,7%	109	26,8%
avec la famille d'origine (parents, etc.)	62	19,7%	11	11,8%	73	17,9%
avec un-e partenaire (avec ou sans enfant)	20	6,4%	20	21,5%	40	9,8%
avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)	29	9,2%	5	5,4%	34	8,4%
en prison	30	9,6%	4	4,3%	34	8,4%
institution thérapeutique/foyer	60	19,1%	21	22,6%	81	19,9%
hôpital/clinique	17	5,4%	2	2,2%	19	4,7%
autre	9	2,9%	8	8,6%	17	4,2%
Total	314	100,0%	93	100,0%	407	100,0%
Missing	45		13		58	

B2 Pour 55% des personnes, le logement à la sortie peut être qualifié de stable.

B2 Type de domicile après la sortie (vnac040)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
situation de logement stable	170	53,5%	55	58,5%	225	54,6%
situation de logement instable et/ou sdf	35	11,0%	8	8,5%	43	10,4%
en prison	30	9,4%	4	4,3%	34	8,3%
institution therap., foyer, hôpital, clinique	79	24,8%	25	26,6%	104	25,2%
autre	4	1,3%	2	2,1%	6	1,5%
Total	318	100,0%	94	100,0%	412	100,0%
Missing	41		12		53	

Relations

.....

B3 64% des client-e-s ne sont pas en couple au moment de leur sortie. Les femmes sont 45% à vivre seules à ce moment-là, ce qui est significativement plus rare que pour les hommes (70%) (Cr's V=.23, $p<.000$).

B3 Type de domicile après la sortie (vzas010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
sans partenaire, seul-e	220	69,8%	40	44,9%	260	64,4%
relation(s) temporaire(s)	24	7,6%	9	10,1%	33	8,2%
partenaire fixe en vivant séparé-e	43	13,7%	21	23,6%	64	15,8%
partenaire fixe en ménage commun	28	8,9%	19	21,3%	47	11,6%
Total	315	100,0%	89	100,0%	404	100,0%
Missing	44		17		61	

Source de revenu

.....

B4 A leur sortie ou après celle-ci, 55% des personnes ont pour source de revenu principale l'aide sociale, 17% une rente et 15% leur propre activité lucrative. Le mode de sortie laisse apparaître une différence très significative (sans tableau): 23% des client-e-s étant sortis comme prévu ont à leur sortie leur propre activité lucrative contre 6% dans les cas d'interruption de traitement. Les personnes dont le traitement est interrompu sont significativement plus nombreuses (65%) que celles dont le traitement s'est achevé comme prévu (48%) à être financées par l'aide sociale (Cr's $V=.27$; $p<.000$).

B4 Principale source de revenu après la sortie (vnac050)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
salaire	53	16,7%	10	10,6%	63	15,3%
rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)	53	16,7%	18	19,1%	71	17,3%
aide sociale	170	53,6%	54	57,4%	224	54,5%
assurance-chômage	5	1,6%	2	2,1%	7	1,7%
soutien du/de la partenaire	0	0,0%	4	4,3%	4	1,0%
soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s	10	3,2%	2	2,1%	12	2,9%
deal/petit trafic	1	0,3%	1	1,1%	2	0,5%
assurance d'indemnités journalières	7	2,2%	1	1,1%	8	1,9%
autre: mesure, justice	13	4,1%	1	1,1%	14	3,4%
autre: divers	5	1,6%	1	1,1%	6	1,5%
Total	317	100,0%	94	100,0%	411	100,0%
Missing	42		12		54	

Activité rémunératrice

.....

B5 Après leur sortie, 38% des client-e-s ne sont pas actifs sur le marché de l'emploi (y compris les catégories suivantes: sans travail, car sans espoir d'en trouver un; rente; incapacité de travail; sans la catégorie "sans travail, mais en quête d'emploi"). 19% ont un travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel ou encore sous forme d'activités occasionnelles. Ils sont 22% sans travail mais en recherche d'emploi et 9% en formation. Une différence très significative apparaît selon le mode de sortie (sans tableau): les client-e-s qui ont achevé le traitement comme prévu sont 24% à être actifs sur le marché du travail (à temps plein ou à temps partiel), une fréquence significativement plus élevée que les 8% de celles et ceux qui ont interrompu le traitement. Ces client-e-s sont d'ailleurs aussi plus souvent en formation (13%) que les client-e-s qui ont interrompu le traitement (5%). Ces client-e-s, en revanche, sont proportionnellement bien plus nombreux à ne pas avoir de perspective d'emploi (34%) que les client-e-s ayant achevé le traitement comme prévu (11%) (Cr's $V=.35$, $p<.000$).

B5 Activité rémunératrice après la sortie (vnac060)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
activité professionnelle à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)	45	13,8%	7	7,4%	52	12,4%
activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)	12	3,7%	4	4,3%	16	3,8%
jobs occasionnels (sans emploi fixe)	10	3,1%	1	1,1%	11	2,6%
en formation (école, études, apprentissage)	30	9,2%	9	9,6%	39	9,3%
sans travail, mais en quête d'emploi	72	22,0%	19	20,2%	91	21,6%
sans travail, sans recherche d'emploi car sans espoir d'en trouver un	73	22,3%	18	19,1%	91	21,6%
rentier/rentière (retraite, AVS, économies)	7	2,1%	1	1,1%	8	1,9%
incapacité de travail (AI/indemnités journalières)	43	13,1%	18	19,1%	61	14,5%
femme/homme au foyer	0	0,0%	9	9,6%	9	2,1%
autre: mesure pour soutenir l'emploi, atelier protégé, stage	10	3,1%	3	3,2%	13	3,1%
autre: détention préventive, emprisonnement	8	2,4%	0	0,0%	8	1,9%
autre: institution	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
autre: aide sociale	7	2,1%	2	2,1%	9	2,1%
autre: divers	9	2,8%	3	3,2%	12	2,9%
Total	327	100,0%	94	100,0%	421	100,0%
Missing	32		12		44	

Formation

.....

B6 Au cours du traitement: commencé ou poursuivi une ou plusieurs formations (vnac068y-b)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune	312	89,1%	89	90,8%	401	89,5%
oui, commencée	25	7,1%	6	6,1%	31	6,9%
oui, poursuivie	13	3,7%	3	3,1%	16	3,6%
Total	350	100,0%	98	100,0%	448	100,0%
Missing	9		8		17	

B8 Niveau de formation le plus élevé (avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme) (vnac070y - vnac070h)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
aucune ou école obligatoire inachevée	30	9,7%	6	6,7%	36	9,1%
école obligatoire	113	36,7%	34	38,2%	147	37,0%
formation de transition	10	3,2%	6	6,7%	16	4,0%
formation générale sans maturité	6	1,9%	3	3,4%	9	2,3%
formation professionnelle de base et apprentissage	133	43,2%	36	40,4%	169	42,6%
maturité ou école normale	6	1,9%	2	2,2%	8	2,0%
formation professionnelle supérieure	7	2,3%	1	1,1%	8	2,0%
haute école spécialisée et université	3	1,0%	1	1,1%	4	1,0%
Total	308	100,0%	89	100,0%	397	100,0%
Missing	51		17		68	

Dettes

.....

B9 L'endettement reste un problème important pour la clientèle, y compris après la sortie. À leur sortie, 23% des client-e-s ne sont pas endettés. Pour 20% de la clientèle, l'endettement va de 25 001 à 100 000 francs ou plus.

B9 Dettes au moment de la sortie (vyaf030)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
dettes pour un montant inconnu	77	28,2%	19	26,4%	96	27,8%
aucune dette	56	20,5%	23	31,9%	79	22,9%
jusqu'à 5000 CHF	25	9,2%	10	13,9%	35	10,1%
de 5001 à 10 000 CHF	24	8,8%	7	9,7%	31	9,0%
de 10 001 à 25 000 CHF	27	9,9%	7	9,7%	34	9,9%
de 25 001 à 50 000 CHF	32	11,7%	5	6,9%	37	10,7%
de 50 001 à 100 000 CHF	12	4,4%	0	0,0%	12	3,5%
plus de 100 000 CHF	20	7,3%	1	1,4%	21	6,1%
Total	273	100,0%	72	100,0%	345	100,0%
Missing	86		34		120	

Situation juridique: mesures , procédures en cours, décisions

.....

B10 Une mesure est prévue à la sortie pour 24% de la clientèle.

B10 Mesures en vigueur à la sortie? (vyar009)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune mesure	232	69,5%	71	78,0%	303	71,3%
en attente de clarification	16	4,8%	3	3,3%	19	4,5%
oui, une ou plusieurs mesure(s) sont encore en vigueur	86	25,7%	17	18,7%	103	24,2%
Total	334	100,0%	91	100,0%	425	100,0%
Missing	25		15		40	

B11 Parmi les mesures prévues, 22% sont une poursuite de la mesure, 21% une assistance de probation et 20% l'exécution d'une peine suspendue.

B11 Quelles mesures en vigueur à la sortie (plusieurs réponses: vyar010a - vyar010i)

			hommes	femmes	TOTAL
	curatelle de portée générale (tutelle) (art. 398 CC)	réponses	8	2	10
		personnes %	9,6%	12,5%	10,1%
	curatelle de représentation (curatelle de représ.) (art. 394 CC)	réponses	8	3	11
		personnes %	9,6%	18,8%	11,1%
	curatelle d'accompagnement (curatelle volontaire) (art. 393 CC)	réponses	5	1	6
		personnes %	6,0%	6,3%	6,1%
	curatelle de coopération (conseil légal coopérant) (art. 396 CC)	réponses	0	0	0
		personnes %	0,0%	0,0%	0,0%
	assistance de probation (art. 93 CP)	réponses	17	4	21
		personnes %	20,5%	25,0%	21,2%
	exécution d'une peine suspendue (p.ex. selon art. 62a CP)	réponses	17	3	20
		personnes %	20,5%	18,8%	20,2%
	mesure de droit pénal des mineurs (p.ex. selon art. 10 ss. DPMIn, art. 14 DPMIn)	réponses	5	0	5
		personnes %	6,0%	0,0%	5,1%
	réponses	18	4	22	
	personnes %	21,7%	25,0%	22,2%	
	réponses	16	1	17	
	personnes %	19,3%	6,3%	17,2%	
Total	réponses		94	18	112
	réponses %		100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes		83	16	99
	personnes %		113,3%	112,5%	113,1%
Missing			3	1	4

B12 Une procédure est en cours pour 16% de la clientèle.

B12 Procédures en cours au moment de la sortie (vyar019)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune procédure en cours	247	83,7%	73	86,9%	320	84,4%
oui, procédure(s) en cours	48	16,3%	11	13,1%	59	15,6%
Total	295	100,0%	84	100,0%	379	100,0%
Missing	64		22		86	

B13 Pour 62% des personnes, les procédures concernent des infractions à la loi sur les stupéfiants; pour 26%, elles portent sur des vols et 23% concernent des actes de violence (plusieurs réponses possibles).

B13 Quelles procédures en cours au moment de la sortie (plusieurs réponses: vzar020a - vzar020j)

		hommes	femmes	Total
	procédure fondée sur le droit matrimonial	réponses	0	1
		personnes %	0,0%	2,1%
	procédure tutélaire	réponses	2	2
		personnes %	5,4%	4,3%
	conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire	réponses	3	4
		personnes %	8,1%	8,5%
	infractions à la loi sur la circulation routière	réponses	3	4
		personnes %	8,1%	8,5%
	infractions à la loi sur les stupéfiants	réponses	22	29
		personnes %	59,5%	61,7%
	vol	réponses	8	12
		personnes %	21,6%	25,5%
	autres atteintes à la propriété	réponses	5	6
		personnes %	13,5%	12,8%
	atteinte aux mœurs	réponses	1	1
		personnes %	2,7%	2,1%
	actes de violence	réponses	7	11
		personnes %	18,9%	23,4%
	autres délits	réponses	7	7
		personnes %	18,9%	14,9%
Total	réponses	58	19	77
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	37	10	47
	personnes %	156,8%	190,0%	163,8%
Missing		11	1	12

B14 Des mesures ou décisions administratives ou judiciaires ont été prononcées à l'encontre de 25% des client-e-s.

B14 Mesures ou décisions administratives ou judiciaires prononcées au moment de la sortie (vyar029)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
non, aucune règle de conduite prononcée	226	75,3%	63	72,4%	289	74,7%
oui, règle(s) de conduite prononcée(s)	74	24,7%	24	27,6%	98	25,3%
Total	300	100,0%	87	100,0%	387	100,0%
Missing	59		19		78	

B15 Pour 29% de la clientèle concernée par une mesure ou une décision, cette mesure ou décision consiste dans la poursuite d'une mesure; pour 26%, elle consiste dans une assistance de probation et pour 18%, il s'agit d'un traitement ambulatoire.

B15 Quelles mesures ou décisions administratives ou judiciaires pronocées au moment de la sortie? (plusieurs réponses: vyar030b - vyar030h)

		hommes	femmes	Total	
	retrait du permis de conduire	réponses	3	0	3
		personnes %	4,8%	0,0%	3,6%
	prise en charge ambulatoire (art. 63 CP)	réponses	7	8	15
		personnes %	11,3%	36,4%	17,9%
	exécution d'une peine suspendue (selon art. 62aCP)	réponses	12	2	14
		personnes %	19,4%	9,1%	16,7%
	poursuite de la mesure (selon art. 59 ou 60 CP)	réponses	18	6	24
		personnes %	29,0%	27,3%	28,6%
	assistance de probation (art. 93 CP)	réponses	18	4	22
		personnes %	29,0%	18,2%	26,2%
	suspension conditionnelle de la mesure (art. 62 CP)	réponses	7	2	9
		personnes %	11,3%	9,1%	10,7%
	autre	réponses	7	6	13
		personnes %	11,3%	27,3%	15,5%
Total	réponses		72	28	100
	réponses %		100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes		62	22	84
	personnes %		116,1%	127,3%	119,0%
Missing		12	2	14	

C CONSOMMATIONS et DÉPENDANCE

C1 Indépendamment de toute consommation effective ou non, l'alcool représentait un problème pour 46% des client-e-s au moment de la sortie; il en va de même pour 43% avec la cocaïne, pour 34% avec l'héroïne et pour 30% avec le cannabis.

C1 Quelles substances sont un problème au moment de la sortie? (plusieurs réponses; vnad010y-j)

		hommes	femmes	TOTAL
aucune substance n'est un problème	réponses	52	12	64
	personnes %	15,2%	12,8%	14,6%
alcool	réponses	170	29	199
	personnes %	49,6%	30,9%	45,5%
héroïne	réponses	119	31	150
	personnes %	34,7%	33,0%	34,3%
méthadone (sans prescription)	réponses	12	2	14
	personnes %	3,5%	2,1%	3,2%
buprénorphine (sans prescription)	réponses	3	0	3
	personnes %	0,9%	0,0%	0,7%
fentanyl (sans prescription)	réponses	1	0	1
	personnes %	0,3%	0,0%	0,2%
autres opioïdes	réponses	3	1	4
	personnes %	0,9%	1,1%	0,9%
cocaïne	réponses	149	38	187
	personnes %	43,4%	40,4%	42,8%
crack	réponses	9	3	12
	personnes %	2,6%	3,2%	2,7%
autres formes de cocaïne	réponses	3	1	4
	personnes %	0,9%	1,1%	0,9%
amphétamines	réponses	22	2	24
	personnes %	6,4%	2,1%	5,5%
métamphétamines (crystal meth, ice, pilules thaï)	réponses	8	3	11
	personnes %	2,3%	3,2%	2,5%
MDMA et substances similaires (ecstasy)	réponses	13	5	18
	personnes %	3,8%	5,3%	4,1%
cathinones synthétiques (MDPV, méphédron, méthédron)	réponses	1	0	1
	personnes %	0,3%	0,0%	0,2%
autres stimulants	réponses	2	0	2
	personnes %	0,6%	0,0%	0,5%
barbituriques (sans prescription)	réponses	2	0	2
	personnes %	0,6%	0,0%	0,5%
benzodiazépines (sans prescription)	réponses	41	5	46
	personnes %	12,0%	5,3%	10,5%
GHB, GBL	réponses	6	1	7
	personnes %	1,7%	1,1%	1,6%
autres somnifères, tranquillisants	réponses	2	2	4
	personnes %	0,6%	2,1%	0,9%

C2 Si l'on regroupe les substances, l'alcool pose problème à 46% de la clientèle, la cocaïne et ses dérivés à 44%, les opioïdes à 35% des client-e-s, et enfin le cannabis à 30% des client-e-s. Le tabac pose problème pour 35% de la clientèle.

C2 Quelles substances sont un problème au moment de la sortie? catégorisé (vnad010y-kd)

		hommes	femmes	TOTAL
aucune substance n'est un problème	réponses	52	12	64
	personnes %	15,2%	12,8%	14,6%
alcool	réponses	170	29	199
	personnes %	49,6%	30,9%	45,5%
opioïdes (sans prescription)	réponses	121	32	153
	personnes %	35,3%	34,0%	35,0%
cocaïne et dérivé	réponses	151	40	191
	personnes %	44,0%	42,6%	43,7%
stimulants	réponses	31	6	37
	personnes %	9,0%	6,4%	8,5%
somnifères, tranquillisants (sans prescription)	réponses	44	7	51
	personnes %	12,8%	7,4%	11,7%
halluzinogènes	réponses	7	2	9
	personnes %	2,0%	2,1%	2,1%
cannabis	réponses	108	21	129
	personnes %	31,5%	22,3%	29,5%
tabac	réponses	116	37	153
	personnes %	33,8%	39,4%	35,0%
autres substances (tous types)	réponses	5	1	6
	personnes %	1,5%	1,1%	1,4%
troubles comparables à une addiction	réponses	13	8	21
	personnes %	3,8%	8,5%	4,8%
Total	réponses	818	195	1013
	réponses %	100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes	343	94	437
	personnes %	238,5%	207,4%	231,8%
Missing		16	12	28

Substance posant problème : fréquence de la consommation (derniers 30 jours)

.....

Les tableaux **C2.1 - C2.8** ci-après présentent la fréquence de consommation, durant les 30 jours qui précèdent la sortie, des substances indiquées comme posant problème au moment de l'ENTRÉE, hormis la substance la plus problématique. Il apparaît ainsi que la consommation quotidienne ou quasi-quotidienne est plutôt rare (exception: le tabac).

C2.1 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe ALCOOL (vnad015a)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	5	3,7%	1	4,3%	6	3,8%
4-6 jours par semaine	6	4,4%	0	0,0%	6	3,8%
2-3 jours par semaine	25	18,5%	1	4,3%	26	16,5%
1 jour par semaine ou moins	39	28,9%	11	47,8%	50	31,6%
aucune consommation	60	44,4%	10	43,5%	70	44,3%
Total	135	100,0%	23	100,0%	158	100,0%
Missing	35		6		41	

C2.2 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe OPIOÏDES, sans prescription (vnad015ba-be)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	2	2,1%	0	0,0%	2	1,7%
2-3 jours par semaine	9	9,6%	1	4,3%	10	8,5%
1 jour par semaine ou moins	35	37,2%	10	43,5%	45	38,5%
aucune consommation	48	51,1%	12	52,2%	60	51,3%
Total	94	100,0%	23	100,0%	117	100,0%
Missing	27		9		36	

C2.3 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe COCAÏNE ou DÉRIVÉ (vnad015ca-cc)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	2	1,7%	1	3,3%	3	2,0%
4-6 jours par semaine	3	2,6%	0	0,0%	3	2,0%
2-3 jours par semaine	14	12,0%	2	6,7%	16	10,9%
1 jour par semaine ou moins	33	28,2%	11	36,7%	44	29,9%
aucune consommation	65	55,6%	16	53,3%	81	55,1%
Total	117	100,0%	30	100,0%	147	100,0%
Missing	34		10		44	

C2.4 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe STIMULANTS (vnad015da-de)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
2-3 jours par semaine	1	5,0%	0	0,0%	1	4,3%
1 jour par semaine ou moins	8	40,0%	1	33,3%	9	39,1%
aucune consommation	11	55,0%	2	66,7%	13	56,5%
Total	20	100,0%	3	100,0%	23	100,0%
Missing	11		3		14	

C2.5 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe SOMNIFÈRES, TRANQUILLISANTS (vnad015ea-ed)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	4	12,5%	1	16,7%	5	13,2%
2-3 jours par semaine	4	12,5%	0	0,0%	4	10,5%
1 jour par semaine ou moins	7	21,9%	3	50,0%	10	26,3%
aucune consommation	17	53,1%	2	33,3%	19	50,0%
Total	32	100,0%	6	100,0%	38	100,0%
Missing	12		1		13	

C2.6 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe HALLUCINOGENES (vnad015fa-fc)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
2-3 jours par semaine	2	33,3%	0	0,0%	2	28,6%
aucune consommation	4	66,7%	1	100,0%	5	71,4%
Total	6	100,0%	1	100,0%	7	100,0%
Missing	1		1		2	

C2.7 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe CANNABIS (vnad015h)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	7	8,4%	1	6,3%	8	8,1%
4-6 jours par semaine	3	3,6%	0	0,0%	3	3,0%
2-3 jours par semaine	12	14,5%	0	0,0%	12	12,1%
1 jour par semaine ou moins	28	33,7%	5	31,3%	33	33,3%
aucune consommation	33	39,8%	10	62,5%	43	43,4%
Total	83	100,0%	16	100,0%	99	100,0%
Missing	25		5		30	

C2.8 Fréquence de la consommation (derniers 30 jours): sous-groupe TABAC (vnad015i)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
chaque jour	104	99,0%	35	100,0%	139	99,3%
aucune consommation	1	1,0%	0	0,0%	1	0,7%
Total	105	100,0%	35	100,0%	140	100,0%
Missing	11		2		13	

Problème principal à l'ADMISSION et consommation au cours des 30 jours précédant la sortie

.....

C3 Problème principal à l'admission (vmed010 resp. vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
alcool	60	17,1%	18	17,8%	78	17,3%
opioïdes (sans prescription)	99	28,3%	28	27,7%	127	28,2%
cocaïne, crack, autre	102	29,1%	36	35,6%	138	30,6%
stimulants	14	4,0%	4	4,0%	18	4,0%
somnifères, tranquillisants (sans prescrip.)	14	4,0%	3	3,0%	17	3,8%
hallucinogènes	2	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
cannabis	54	15,4%	9	8,9%	63	14,0%
tabac	4	1,1%	3	3,0%	7	1,6%
autre substances	1	0,3%	0	0,0%	1	0,2%
Total	350	100,0%	101	100,0%	451	100,0%
Missing_	9		5		14	

C4 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission ALCOOL (vmed010/vned010, vnad015a)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	1	10,0%	1	2,0%
4-6 jours par semaine	3	7,5%	0	0,0%	3	6,0%
2-3 jours par semaine	8	20,0%	0	0,0%	8	16,0%
1 jour par semaine ou moins	8	20,0%	2	20,0%	10	20,0%
aucune consommation	21	52,5%	7	70,0%	28	56,0%
Total	40	100,0%	10	100,0%	50	100,0%
Missing_	20		8		28	

C5 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission OPIOÏDES, sans prescription (vmed010/vned010, vnad015ba-be)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	3,9%	0	0,0%	2	3,1%
2-3 jours par semaine	4	7,8%	1	7,1%	5	7,7%
1 jour par semaine ou moins	21	41,2%	7	50,0%	28	43,1%
aucune consommation	24	47,1%	6	42,9%	30	46,2%
Total	51	100,0%	14	100,0%	65	100,0%
Missing_	48		14		62	

C6 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission COCAÏNE et DÉRIVÉ (vmed010/vned010, vнад015ca-cc)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	0	0,0%	1	6,7%	1	1,3%
4-6 jours par semaine	3	4,8%	0	0,0%	3	3,8%
2-3 jours par semaine	7	11,1%	1	6,7%	8	10,3%
1 jour par semaine ou moins	21	33,3%	5	33,3%	26	33,3%
aucune consommation	32	50,8%	8	53,3%	40	51,3%
Total	63	100,0%	15	100,0%	78	100,0%
Missing_	39		21		60	

C7 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission STIMULANTS (vmed010/vned010, vнад015da-de)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
1 jour par semaine ou moins	1	33,3%	0	0,0%	1	25,0%
aucune consommation	2	66,7%	1	100,0%	3	75,0%
Total	3	100,0%	1	100,0%	4	100,0%
Missing_	11		3		14	

C8 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission MÉDICAMENTS (vmed010/vned010, vнад015ea-ed)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	33,3%	1	100,0%	3	42,9%
2-3 jours par semaine	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%
1 jour par semaine ou moins	1	16,7%	0	0,0%	1	14,3%
aucune consommation	2	33,3%	0	0,0%	2	28,6%
Total	6	100,0%	1	100,0%	7	100,0%
Missing_	8		2		10	

C9 Consommation (derniers 30 jours): sous-groupe: problème principal à l'admission CANNABIS (vmed010/vned010, vнад015h)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
chaque jour	2	8,0%	0	0,0%	2	6,5%
2-3 jours par semaine	2	8,0%	0	0,0%	2	6,5%
1 jour par semaine ou moins	7	28,0%	1	16,7%	8	25,8%
aucune consommation	14	56,0%	5	83,3%	19	61,3%
Total	25	100,0%	6	100,0%	31	100,0%
Missing_	29		3		32	

Objectif de consommation

.....

C10 68% des client-e-s indiquent avoir pour objectif de consommation l'abstinence complète, 16% la consommation contrôlée. 70% des client-e-s (problème OPIOÏDES, **C12**) et 74% des client-e-s (problème COCAÏNE et dérivés, **C13**) indiquent avoir pour objectif de consommation l'abstinence complète.

C10 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance posant problème au moment de la sortie? (vzao010)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
abstinence définitive	175	68,6%	47	63,5%	222	67,5%
abstinence limitée dans le temps	13	5,1%	4	5,4%	17	5,2%
consommation contrôlée	41	16,1%	11	14,9%	52	15,8%
aucune limitation envisagée	6	2,4%	5	6,8%	11	3,3%
pas déterminé pour l'instant	18	7,1%	5	6,8%	23	7,0%
autre	2	0,8%	2	2,7%	4	1,2%
Total	255	100,0%	74	100,0%	329	100,0%
Missing	104		32		136	

C11 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: ALCOOL (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	28	57,1%	9	64,3%	37	58,7%
abstinence limitée dans le temps	2	4,1%	0	0,0%	2	3,2%
consommation contrôlée	12	24,5%	4	28,6%	16	25,4%
aucune limitation envisagée	1	2,0%	1	7,1%	2	3,2%
pas déterminé pour l'instant	6	12,2%	0	0,0%	6	9,5%
Total	49	100,0%	14	100,0%	63	100,0%
Missing_	11		4		15	

C12 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: OPIOÏDES, sans prescription (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	48	72,7%	10	58,8%	58	69,9%
abstinence limitée dans le temps	4	6,1%	2	11,8%	6	7,2%
consommation contrôlée	6	9,1%	1	5,9%	7	8,4%
aucune limitation envisagée	0	0,0%	1	5,9%	1	1,2%
pas déterminé pour l'instant	7	10,6%	2	11,8%	9	10,8%
autre	1	1,5%	1	5,9%	2	2,4%
Total	66	100,0%	17	100,0%	83	100,0%
Missing_	33		11		44	

C13 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: COCAÏNE et DÉRIVÉ (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	56	74,7%	16	69,6%	72	73,5%
abstinence limitée dans le temps	4	5,3%	0	0,0%	4	4,1%
consommation contrôlée	7	9,3%	4	17,4%	11	11,2%
aucune limitation envisagée	4	5,3%	1	4,3%	5	5,1%
pas déterminé pour l'instant	3	4,0%	2	8,7%	5	5,1%
autre	1	1,3%	0	0,0%	1	1,0%
Total	75	100,0%	23	100,0%	98	100,0%
Missing_	27		13		40	

C14 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: STIMULANTS (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	8	66,7%	2	66,7%	10	66,7%
abstinence limitée dans le temps	1	8,3%	0	0,0%	1	6,7%
consommation contrôlée	2	16,7%	0	0,0%	2	13,3%
pas déterminé pour l'instant	1	8,3%	1	33,3%	2	13,3%
Total	12	100,0%	3	100,0%	15	100,0%
Missing_	2		1		3	

C15 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: MÉDICAMENTS, sans prescription (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	5	50,0%	0	0,0%	5	45,5%
abstinence limitée dans le temps	1	10,0%	0	0,0%	1	9,1%
consommation contrôlée	4	40,0%	0	0,0%	4	36,4%
autre	0	0,0%	1	100,0%	1	9,1%
Total	10	100,0%	1	100,0%	11	100,0%
Missing_	4		2		6	

C16 Quel objectif de consommation poursuivez-vous face à la principale substance: CANNABIS (vzao010, vmed010/vned010)

	hommes		femmes		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%
abstinence définitive	21	63,6%	5	55,6%	26	61,9%
abstinence limitée dans le temps	1	3,0%	1	11,1%	2	4,8%
consommation contrôlée	9	27,3%	1	11,1%	10	23,8%
aucune limitation envisagée	1	3,0%	2	22,2%	3	7,1%
pas déterminé pour l'instant	1	3,0%	0	0,0%	1	2,4%
Total	33	100,0%	9	100,0%	42	100,0%
Missing_	21		0		21	

Périodes de rechute au cours du traitement

.....

C17 29% des client-e-s indiquent ne pas avoir connu de périodes de rechute durant le traitement concernant leur problème de dépendance, ou alors les thérapeutes indiquent qu'il n'y a pas eu de rechutes. Parmi les personnes qui terminent le traitement comme prévu, 35% indiquent ne pas avoir de période de rechute. Ce taux est de 17% pour les personnes dont le traitement est interrompu. La différence est significative (pas de tableau en illustration; Cr's $V=.15$, $p < .05$).

C17 Périodes de rechute en lien avec le problème de dépendance (vyaz010)

	hommes		femmes		TOTAL act-info-FOS	
	n	%	n	%	n	%
aucune	94	28,7%	26	28,9%	120	28,8%
une fois	48	14,7%	11	12,2%	59	14,1%
deux fois	34	10,4%	12	13,3%	46	11,0%
trois ou quatre fois	63	19,3%	16	17,8%	79	18,9%
cinq fois ou plus	88	26,9%	25	27,8%	113	27,1%
Total	327	100,0%	90	100,0%	417	100,0%
Missing_	32		16		48	

C18 Les rechutes signalées le sont par rapport aux substances suivantes (plusieurs réponses possibles): pour 54% la cocaïne et ses dérivés, pour 50% l'alcool, et pour 42% les opioïdes.

C18 Périodes de rechute: quelle substances? (plusieurs réponses: vyaz020a - vyaz020j)

		hommes	femmes	TOTAL	
	alcool	réponses	126	20	146
		personnes %	54,8%	31,7%	49,8%
	opioïde (héroïne, méthadone, codéïne, etc.)	réponses	93	29	122
		personnes %	40,4%	46,0%	41,6%
	cocaïne ou dérivé	réponses	122	36	158
		personnes %	53,0%	57,1%	53,9%
	autres stimulants (amphétamine, MDMA, méthamphétamine, etc.)	réponses	18	2	20
		personnes %	7,8%	3,2%	6,8%
	somnifères/tranquillisants (benzodiazépine etc.)	réponses	29	6	35
		personnes %	12,6%	9,5%	11,9%
	hallucinogène (LSD, kétamine, etc.)	réponses	6	0	6
		personnes %	2,6%	0,0%	2,0%
	substances volatiles	réponses	1	0	1
		personnes %	0,4%	0,0%	0,3%
	cannabis	réponses	80	19	99
		personnes %	34,8%	30,2%	33,8%
tabac	réponses	18	7	25	
	personnes %	7,8%	11,1%	8,5%	
autres substances	réponses	4	2	6	
	personnes %	1,7%	3,2%	2,0%	
Total	réponses		497	121	618
	réponses %		100,0%	100,0%	100,0%
	nombre de personnes		230	63	293
	personnes %		216,1%	192,1%	210,9%
Missing		3	1	4	

D PRONOSTIC

D1 Par rapport au problème d'addiction, le pronostic établi est bon pour 32% des client-e-s sortant du traitement, et très bon pour 12%. Il n'y a pas de différence entre les sexes.

D1 Pronostic face au problème de dépendance (vzag010)

	sexe				TOTAL	
	hommes		femmes		n	%
	n	%	n	%		
très bon pronostic	34	11,0%	14	17,5%	48	12,3%
bon pronostic	96	31,0%	28	35,0%	124	31,8%
plutôt mauvais pronostic	107	34,5%	25	31,3%	132	33,8%
mauvais pronostic	73	23,5%	13	16,3%	86	22,1%
Total	310	100,0%	80	100,0%	390	100,0%
Missing	49		26		75	

D2a De manière prévisible, le pronostic est étroitement lié au mode de sortie: pour 46% de la clientèle dont le traitement est interrompu, il est défavorable et pour 48 % de cette même clientèle, il est plutôt défavorable. Tel n'est pas le cas pour les personnes ayant achevé le traitement comme prévu : le pronostic est défavorable pour 6% de ce groupe seulement et plutôt défavorable pour 24%. Il est bon ou très bon pour 70% des personnes dont le traitement arrive à terme comme prévu, ce qui n'est le cas que pour 7% de la clientèle interrompant le traitement (Cr's $V=.44$, $p<.000$).

D2a Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie: TOTAL (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	43	19,8%	1	0,8%	3	6,1%	47	12,2%
bon pronostic	108	49,8%	7	5,9%	9	18,4%	124	32,3%
plutôt mauvais pronostic	53	24,4%	56	47,5%	21	42,9%	130	33,9%
mauvais pronostic	13	6,0%	54	45,8%	16	32,7%	83	21,6%
Total	217	100,0%	118	100,0%	49	100,0%	384	100,0%

D2b Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie: HOMMES (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	32	19,5%	0	0,0%	2	5,1%	34	11,1%
bon pronostic	83	50,6%	6	5,9%	7	17,9%	96	31,5%
plutôt mauvais pronostic	39	23,8%	51	50,0%	15	38,5%	105	34,4%
mauvais pronostic	10	6,1%	45	44,1%	15	38,5%	70	23,0%
Total	164	100,0%	102	100,0%	39	100,0%	305	100,0%

D2c Pronostic face au problème de dépendance et circonstances des sortie: FEMMES (vzag010, vmab040 sans autre raisons), sans missing

	fin régulière avec ou sans tranfert		rupture ou perte de contact		autre		TOTAL	
	n	%	n	%	n	%	n	%
très bon pronostic	11	20,8%	1	6,3%	1	10,0%	13	16,5%
bon pronostic	25	47,2%	1	6,3%	2	20,0%	28	35,4%
plutôt mauvais pronostic	14	26,4%	5	31,3%	6	60,0%	25	31,6%
mauvais pronostic	3	5,7%	9	56,3%	1	10,0%	13	16,5%
Total	53	100,0%	16	100,0%	10	100,0%	79	100,0%